

三
ノ
下

T

2

#1336609111
v. 7

編註醫學入門 三卷上

外感

溫暑 兼五運主病樞要 三十一十八劑

傷寒 五六經正病 十一表裏陰陽汗吐下溫解

十六正傷寒 五北類傷寒 十八初症 十八雜症 五變証

卒瘵症 三危証 四死証 五婦女傷寒

5

論語	卷一	學而篇	子曰學而不思則罔思而不學則殆
論語	卷二	先進篇	子曰磨而不磷灑而不沉
論語	卷三	陽貨篇	子曰性相近也習相遠也
論語	卷四	微子篇	子曰賢者辟世
論語	卷五	季氏篇	子曰君子有三畏
論語	卷六	鄉黨篇	子曰食而後食
論語	卷七	雍也篇	子曰知微
論語	卷八	公冶長篇	子曰巧言令色
論語	卷九	子罕篇	子曰一以足之
論語	卷十	子貢篇	子曰有死無命
論語	卷十一	子路篇	子曰不得志
論語	卷十二	子夏篇	子曰百工居四時
論語	卷十三	子游篇	子曰有教無類
論語	卷十四	子張篇	子曰有文事
論語	卷十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷二十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷三十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷四十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷五十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷六十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷七十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷八十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十一	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十二	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十三	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十四	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十五	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十六	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十七	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十八	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷九十九	子季氏篇	子曰一言而蔽之
論語	卷一百	子季氏篇	子曰一言而蔽之

論語

卷一

傷寒序

欲識傷寒之義者先正傷寒之名百問云冬曰傷寒春曰
溫病夏曰熱病通而言之為傷寒者何哉蓋邪之所湊其
氣必虛冬月陽氣不密以致寒邪觸犯其即發而為病者
名曰傷寒其不即發至春感溫氣而發者名曰溫病至夏
感熱氣而發者名曰熱病溫熱雖發於春夏而其受病之
因隔冬寒毒藏於肌膚而自裏發之故通而言之為傷寒
也仲景傷寒立論萬世典也河間溫暑補方三時用耳至
於傳經直中分別陰陽雜症乃丹溪之獨見傷寒大義如

此然西北風高傷寒者多東南地燠內傷者多是以東垣
又作內外傷論以辨之傷寒之書至此可謂全且脩矣奈
何今之醫者或讀傷寒一二而不理會雜病內傷或竊內
傷雜病一二而不理會傷寒主傷寒者專一發散主內傷
者專一溫補內外莫辨殺人慣矣陶節菴曰醫者不可一
日不讀傷寒以活心源愚謂讀傷寒而不讀三子之書亦
不足以活心源噫三世四家之書缺一不可

萬曆丙子初夏

編註醫學入門外集卷之三

△病機

○外感

溫暑傷寒

河間劉先生溫暑纂要

諸風掉眩乃肝木

掉搖也眩昏亂旋運也由風木旺甚生火風火屬陽陽主乎動兩動相搏為之

轉痛痒瘡瘍心火屬

人近火氣者微熱則痒熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也痒者美

疾也故火旺於夏而萬物蕃美或云痛為實痒為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也痒得爬而解者爬令皮膚辛辣而屬金化辛能散故也瘡瘍屬熱而出膿水猶肉果熱極則腐潰而為水反兼水之化也

濕腫滿本

脾土經

地之體也土濕過極則痞塞腫滿物濕亦然故長夏屬土則廢物降盛也

氣臍鬱痿肺

金伏

臍謂臍滿也鬱謂奔迫也痿謂手足痿弱無力以運動也大抵肺主氣病則其氣臍滿奔迫不能上升至

於手足痿弱不能運動由肺金本燥燥之為病血衰不能榮養百骸故指得血而能攝足得血而能步秋金旺則霧氣蒙鬱而草木萎落病之象也萎猶痿也寒之收引腎水鄉也故冬寒則拘筋

五運主病樞要目

諸暴強直支痛裏急筋縮腰戾本足肝膽二經厥陰風木

之氣暴卒而強直堅勁也支痛支持也謂堅固支持筋縮不柔而痛也腰縮也戾乖戾也謂筋縮裏急乖戾失

常而病也然燥金勁切木病反兼金化由九則害承乃制也况風能勝濕而為燥也風病勢甚而成筋緩者燥之甚也故甚者皆

兼於燥也

諸病喘嘔及吐酸暴注下迫轉筋難小便渾濁血溢泄瀉

氣結核瘍疹斑癰疽吐下霍亂症瘰癧腫脹鼻塞乾軌衄

淋秘身發熱惡寒戰慄驚惑間笑悲譫妄衄衄汚腹脹鼓
之有聲和少陰君火手二經真心小腸氣之過喘火氣甚則氣盛而
息粗也嘔胃膈熱甚火炎之象也吐酸木味為酸如飲食
熱則易於酸矣暴注卒瀉火性速故也下迫裏急後重也
火燥能令下焦急迫也轉筋熱燥於筋而自轉也小便渾
濁寒則水清熱則水濁溢血出於上竅衄血出於下竅瘰
氣赤瘰丹癰熱氣脹也結核熱氣鬱結癆有頭小瘰也疹
浮小癰疹也癰淺而大疽深而惡吐下霍亂熱甚氣則傳
化失常或下水穀不及變化膜胃膈憤悶或引背痛也鬱
熱極則腠理鬱結而氣道不通也腫脹陽熱太甚則腫滿
膜脹鼻塞寒主收斂故陽氣不通熱鼻出清涕衄鼻出血
淋熱客膀胱秘太便澀滯熱能耗液故也發熱惡寒邪在
表也戰慄火熱過極反兼水化悲則傷腎水衰故也驚心
卒動而不寧惑昏惑而志不一笑火盛喜發悲火盛凌金
金不受制故發悲譫多言也心熱神亂則言妄出妄狂妄
也心熱神昏則目有所見衄汚鼻出紫黑血也腹脹鼓熱

甚則氣盛
脹滿如鼓

痙與強直積飲滯霍亂中滿諸隔痞體重吐下肘腫痿肉

如泥之按不起太陰濕土二足經脾與從中胃之氣也強

直謂強項也太陽經中濕令人項強有剛柔之分積飲留

飲也痞否也謂氣不升降也隔阻滯也腸胃濕甚則傳化

失常中滿濕則令人中焦滿也吐下霍亂謂腸胃濕飲相

兼故也體重清陽為天濁陰為地濕土為病體重宜也肘

腫濕勝於下也肉如泥按之不起濕勝於身也

諸熱瞽瘈筋惕惕悸動搖擗瘈瘲極暴瘖冒昧躁擾狂罵

詈驚駭氣上逆肘腫疼酸嘔嘔瘡喉痺耳鳴聾欲閉嘔涌

溢食下不能目昧不明瞶瘈翳或禁慄之如喪神暴病暴

死暴注利少陽相火手二經心胞絡與三焦氣氣昏神昏而

熱令肌肉跳動暴瘡卒痘也火盛尅金不能發聲胃味昏

憤也躁擾熱盛於外手足不寧也狂謂乖越禮法而失常

也或登高棄衣熱極故也罵詈言之惡也心火熱極則發

惡言也驚駭君火化同氣逆衝上火氣炎也肺腫熱勝於

內也疼酸火盛制金不能平木嚏鼻中因痒而噴作一聲人

以紙燃擾鼻而嚏作擾動厲火鼻屬肺金故也喉痺熱客

上焦耳鳴熱衝聽戶龍水衰火盛氣道閉塞嘔涌不下熱

盛火炎之家目眦熱極則昏瞶瘼肉跳也禁冷也慄戰慄

也如喪神守火極而似水

化也暴病死火性速也

諸澀枯涸閉乾勁揭皺起陽明之燥金肺與大腸氣身澀

不滑澤也枯不榮生也涸不通流也乾不滋潤

也動不柔和也皺揭皮膚開裂皆血液病耳

上下水液出清冷癥瘕癰疽堅痞病腹滿急痛利白清食

已不饑吐利腥屎伸不便與厥逆厥逆禁固太陽經腎與

膀胱為寒水陰陽標本六氣真

上下水出清冷寒賊水自澄清瘕氣聚之積或聚或

散無有常處也瘕血結之塊蓋由女子月水滯久而成
瘕也亦有熱者當以標本明之癰症足與陰受寒則陰腫
也堅若腹滿急痛如水寒則水硬如地下利清白水寒則
清多明白食已不飽胃寒則不能消穀吐利脾微水甚少
能制火肺金自盛故水腥也屈伸
不便厥逆禁固謂手足膝攣而冷

一十八劑

輕調緩淡清暑濕解和平火奪寒并補耳
溫瀉與榮隨症選用真有古人不傳之妙

乃補仲景之遺亡也非不遵桂枝麻黃之謂也下
說清平之世同水化也雖辛熱之藥不生他症擾
攘之世同火化也若用辛熱之藥則發黃出斑變
壞之病作矣蓋人內火既動外火又侵所以亡熱
發汗不如辛溫辛溫
又不加辛寒藥也

輕劑防風通聖散合益元散名雙解散在表當汗者俱宜連進數服必愈不解者病已傳變

清劑涼膈散汗吐下後無異症者用下早遂成結胃虛痞或合天水小柴胡

解劑小柴胡湯半表半裏者緩用或合涼膈大柴胡湯裏微熱者用或合解毒湯

寒劑大承氣湯裏大熱者用表裏大熱合大柴胡湯裏熱甚長熱漸微者合解毒湯

調劑調胃承氣湯裏熱無脹吐瓜蒂散喘嘔陽脈緊甚者用

井劑天水益元散傷寒餘熱以此調之火劑黃連解毒湯

暑劑白虎湯中暑自汗者用半表半裏者用或加蒼朮發汗熱不解脉尚浮者用解之或裏熱內盛陽厥極

皆因失下而成此症但進承氣天水合而為一調合陰陽洗滌臟腑則其他症自不生矣

淡劑五苓散中暑白虎解後多服或合天水濕劑三花神祐丸

劑三黃丸

劑補防風當歸飲

劑茱四物湯

劑溫理中湯

結大小陷胃湯丸

心煩不眠施豉湯

煩渴涼膈散合去桂五苓散益元散

上一十八劑二十四方四十四味藥品調治溫暑初症雜症餘症及雜病痰火濕熱曲盡其妙男婦俱同

溫暑終

劑平四君子湯

劑溫胃風湯

劑和平胃散

發爽涼膈散加當歸胃緊加枳壳桔梗

發黃茵陳湯調五苓散

症承氣湯合辟毒諸語發狂者並用已

仲景張先生傷寒纂要

詳傷寒論一百問百病歌活人書活人大全及今陶氏亦書王氏家寶

與各名家惟陸氏傷寒未觀其書

嘗聞病皆起於傷寒治莫精於仲景一百一十三方如水

有源

不過汗吐下瀉和緩溫補總方以變化之也

三百九十七法如衣有領不

陰陽表裏虛實而已

惜乎全書亡而後益支離記性拙而聊從簡省

姑以六經言之

太陽則頭疼身熱脊強

此太陽正病也以後凡言太陽症即頭疼身熱脊強也凡言表症皆

亦即太陽症也各經做此陽從下起三陽之長曰太陽脉

尺寸俱浮浮緊傷寒浮緩傷風太陽受病當一二日發以

其脉上連風府故頭項背腰脊強頭者諸陽之會氣病則

脉血病則痛身熱者寒客皮毛鬱閉其陽而後發熱陽雖

人身正氣虧則為邪為熱熱雖甚不為益傷寒於寒而終成於熱也惟不惡熱而但惡寒者邪發於陰也或熱多寒少或不大便而泉清頻數或熱結膀胱溺澀或汗多溺難或汗後不解或汗漏不止或過經不解或蓄血發黃或喘或嘔皆太陽所以主

陽明則目痛鼻乾不眠陽為明夾於二陽之中陽氣盛極

經病長而沈數則太陽脉靜則不傳如脉數急者吐者此寒邪變熱傳於陽明當二三日發以其經中客邪故目痛鼻乾身熱者陽明主肌肉邪甚則身熱皆熱不眠者煩盛津乾胃氣不和也太陽未罷者發熱惡寒太陽已罷者不惡寒而反惡熱煩渴作嘔津乾便秘或即狂言謂之正陽明少陽陽明協滿不大便而嘔或痰血發黃或下血證語或胃煩懊憹皆此經所主然亦有裏寒下利或寒氣結積而為痼瘕者不可不知

少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口為之苦於陽明故曰少陽脉

尺寸俱弦弦而滑數者陽極發厥弦而和者病欲散少陽受病當三四日發以其脉循脇絡於耳故風熱上壅不利則耳聾脇痛寒熱往來不食嘔而口苦乾目眩若不嘔吐而能食者為三陰不受邪也若身無大熱燥悶者陽去入陰無疑矣似瘧婦人血結皆此經所主

太陰腹滿自利尺寸沈而津不到咽陰從天降首曰太陰在陽為表在陰為裏

邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉故尺寸俱沈沈實有力當下沈細無力當溫太陰受病當四五日發以其脉布胃中絡於咽嗑故腹滿或痛而嗑下乾燥或大便不通小便如常或自利手足溫而渴者為傳經腑熱或自利不渴手足冷者為直中陰症或因內傷飲食冷氣入脾必腹痛胃膈不快然太陰乃三陽之終三陰之始陽經表症未盡宜汗半表裏胃滿多痰宜吐傳經裏熱宜下直中陰經宜溫調脾勝邪正在此關

少陰舌乾口燥次於太陰故曰少陰脉尺寸俱沈沈實有力當下沈微無力當溫少陰受病當五六

日發以其脉起於足心貫腎絡於肺繫於舌乾口燥而渴或自利清水心痛腹脹或大便閉結不欲厚衣者皆熱入裏之深也若厥逆畏寒欲吐不吐腹痛自利小便白或乾嘔亡陽咽痛脉微欲寐者乃陰毒入臟之深也或下利體痛咳嘔者水氣也或飲食入口則吐脉弦遲厥逆心下實者不可下也宜吐之或脉沈發熱者汗之蓋有初得病直攻少陰不先自太陽傳次而入也

厥陰煩滿囊拳

厥陰者陰盡則變而厥逆生蓋傳經至此已盡無復可傳再傳則逆于手經矣脉尺

寸俱沉沉實有力當下流遲無力當溫浮緩者病自愈厥陰受病當六七日發以其脉循陰器絡於肝故唇青舌卷或煩滿者留中氣滿急也或囊拳者陰囊縮也在女子則陰戶急痛引小腹此傳經厥陰風熱毒深於內也肝木移熱於脾脾受賊邪五臟六腑皆困榮衛不通耳聾囊縮而厥水漿不入口不知人則死速下以救五死一生或下利謔語者內有燥屎也仍宜下之或嘔而發熱者和之或發熱惡寒如瘧囊不縮脉微浮微緩胃之脈脾氣既全不受賊

邪榮衛將復水升火降寒熱作而大汗解矣或下利腹脹
身疼者當先救表而後溫裏若下利清穀大汗出而厥四
肢疼小腹拘急或乾嘔吐沫或氣衝心痛發熱消渴吐衄
皆厥陰寒症也宜溫之已上正文六言乃萬病之祖非得
之內經不能六言包括無遺如此凡言六經
所見之症卽此三陽三陰經症也雜病亦然

經絡難拘

經云一日足太陽膀胱之經二日足陽明
胃之經三日足少陽膽之經四日足太陰

脾之經五日足少陰腎之經六日足厥陰肝之經又云傷
寒不加異氣不傳經者七日足太陽病衰手太陽受之頭
痛少愈八日足陽明病衰手陽明受之身熱少歇九日足
少陽病衰手少陽受之耳聾目閉十日足太陰病衰手太
陰受之腹臑如故則思飲食十一日足少陰病衰手少陰
受之渴止舌乾已而嘔十二日足厥陰病衰手厥陰受之
囊縱少腹微下大氣乃止病再傳六經有自安者活人云
一二日可發表而散三四日宜和解而痊五六日不解便
實方可議下此皆論其常耳解論云病人有虛實邪氣
有遲速豈可拘於日數日雖多尚有表症而脉浮數猶當

發汗日雖少已有裏症而脉沉細即當下之但裏症虛實
與脉而汗下之酌節菴云但見太陽症即用麻桂汗太陽
見少陰症即用四逆溫少陰見陽明症即用承氣下陽明
見真寒症直入陰經即救真寒此最活法有循次傳者大
運主氣者初氣厥陰風木二氣少陽相火三氣少陰君火
四氣太陰濕土五氣陽明燥金六氣太陽寒水人生順受
其氣病則逆其氣而傳變自下而上自外而內究其所以
然者陽主動而位外陰主靜而位內人身膀胱氣血之會
自頭背至足無所不主故風寒每先犯之其次胃氣流行
無息自鼻腹至足皆其所主故太陽行叔而交注必及於
陽明也又其次少陽清氣主行榮衛腸肋身側皆其所主
故胃邪必移於膽部此三陽皆身之外而動者故為表至
於太陰人身五臟脾為死陰至靜不動其所消食者全賴
胃氣升降故自少陽脇肋下肚腹宜乎先入太陰也其次
腎主受米穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已故自中
腹移至臍腹必及於腎也又其次肝惟主散血藏血而極
其凝滯故入裏之深至於小腹而下行已極乃復上行
於手經此天然之序不可圖者如此若夫太陽自傳於本

者作渴瀉瀼因誤參也太陽併傳陽明者當用麻黃而反
用葛根以引之也太陽越經傳少陽者當用麻黃而反用
柴胡以引之也太陽傳少陰者當用桂枝而反下以陷之
也太陽傳太陰者當用桂枝而反下以久之也此醫之誤
而亂其傳之序也又有太陽即傳厥陰頭痛甚二經脈
絡相接同督脈而上行也有太陽傷風以致陰血自燥熱
蓄膀胱逆傳小腸與心謂之冤熱有風寒自背入者直中
太陽少陽自而入者直中陽明有首尾只在太陽經而不
傳諸經者有間傳一二經者有不傳而罷者有不罷再傳
者有不自陽經直中陰經者此邪無定體不可拘於日數
也活人云六氣之邪乘虛之經得之

標本須明後先

標者指求本者根本以主言各經絡為

餘做此以客邪言之先受病為本此次受病為標標本相傳
治其急者請詳言之太陽膀胱為本故頭疼脊強小腸為
標與心為表裏故發熱冬月麻黃桂枝餘月九味羌活湯
陽明太腸為標與肺為表裏故微惡寒發熱為經病高根

解肌湯渴而有汗不解者白虎湯胃為本目痛鼻乾潮汗
閉溢滿渴狂譫為肺病調胃承氣湯少陽三焦相火為本
遊行一身故微熱膽為標耳聾脇痛寒熱嘔而口苦綠三
焦無形膽無出入之路故從中治標本俱小柴胡湯太陰
肺為標咽乾身自黃脾為本腹滿痛謂之滯熱咽乾腹滿
手足溫者桂枝加大黃湯或大柴胡湯身目黃者茵陳湯
胃滿者瓜蒂散如自利不渴或嘔吐者屬臟病理中湯九
少陰心為本故舌乾口燥或連臍硬痛或心下硬痛或下
利純清水或譫語便閉小承氣湯腎為標面寒如刀刮唇
青不渴吐利胃腹絞痛四肢厥逆指甲黑踡臥身如被杖
古姜附湯厥陰心為標故舌卷厥逆於過肘膝吐沫
嘔逆不渴小便數者為寒三味參黃湯四順湯肝為本
主男子囊縮女久陰挺乳縮或手足乍冷乍溫大便實消
渴煩滿者傷熱大承氣湯似癰不嘔二便自調者必自愈
不愈脈遲有汗者小建中湯脈瀼無汗者桂枝各辛湯其
囊乳縮症寒症亦有之此萬法之祖也學者於此而一悟
焉則病機到手矣自非仲景玉函內秘其孰能與於斯乎
此後汗吐下溫和解諸方不甚詳載正言宜汗宜吐宜下

宜和
悟之

寒傷榮而風傷衛太陽為之首爾

榮行脉中在血脉其病深衛行脉外在皮膚其

病淺榮血陰也陰主閉藏故寒喜傷榮而無汗衛氣陽也陽主開泄故風喜傷衛而有汗然豈獨太陽為榮衛之會而有風寒之別乎陽明善饑為傷風不食為傷寒少陽耳聾目滿而煩為傷風口苦咽乾目眩為傷寒三陰傷風但四肢煩疼耳太陽為之先者傷寒因腎水耗損至春木無生意故發為溫病至夏絕生化之原發為熱病所以太陽少陰二經受病最多最先

經可解而腑可下陽明為之主焉

表多裏少為在經宜清肌解表裏多表少為在

腑宜和肌通裏蓋陽明標雖主肌而其本則胃也然豈獨陽明為十二經之長而有經腑之異乎仲景曰三陽受病未入于腑可汗而已三陰受病已入于腑可下而已則三陰亦在經者仍宜微汗之蓋榮衛屬太陽主皮毛胃腑屬

陽明主皮膚之下肌肉之上及腸胃也胃腸屬少陽主血榮百節流行三部臟屬三陰主筋骨并兩足故太陽為陽症之表胃為陽症之裏若但以臟腑而分表裏則腑為表臟為裏若合榮衛臟腑而分表裏則表者榮衛之所行裏者胃府之所主而臟則又屬於裏但病入胃則亦不更傳不可不知

少陽原從乎

中治禁汗禁下

少陽居太陽陽明之中半表半裏禁汗恐犯太陽禁下

犯陽明禁下恐生發之氣陷入陰中只宜和之以小禁湯犯三禁則變不可勝他如太陽經禁下與參犯之則血熱入裏而難解陽明經禁汗與參犯之則竭津液而如狂益津液者連發葱白湯是也又下症中治見合病

三陰利用乎變法有中有傳

三陰最不可執有宜下者有宜溫者自三陽氣分傳入三

陰謂之傳經陰症傳非傳入脾腎肝也乃入三陰血分胃與大小腸之府也故仲景謂已入於府可下者是也若不自陽經傳來直中三陰之經初起厥逆腹痛自利不渴太陰自受寒也上症加之嘔吐少陰自受寒也又加之小便

清利厥陰自受寒也。熱藥溫之，猶恐或遲。陰陽一差，生死立判。雖然，傳經直中，先賢發之盡矣。然言無傳變者，乎？假如傳經之際，輕生者，或被生冷，或犯房慾，或粗工猛施，汗下，真氣衰弱，陽症變為陰症，如俗所謂陽症歸陰，仍宜直中寒症法治。故內經止言傳變，而不言直中者，蓋言變則包直中，今局方言傳陰傳陽，則不是。當言傳陽變陰，疾乎？傳經為裏熱，直中與變為裏寒，臨症參脈，直中二陽傳經三陽病在於表，脈浮長弦，傳經三陰病在於裏，脈沉數實，直中二陰病在於經，脈沉微緩，此表裏虛實大分，非專以陽為熱，陰為寒也。

謂傷足而不傷手，則可以寒為足之所司。

手之六經主於春夏，足太陽少

陽正司冬，令觸胃之者，則二經受病。其次則少陽厥陰繼之，冬而司春，令至春分後，方行溫令，故風寒亦能傷之。足陽明與冬本無與，然寄旺四季，寒熱溫涼之氣皆能傷之。况表邪傳裏，必歸脾胃，而為燥糞，用湯藥下之，而胃和矣。謂傳足而不傳手，不可蓋熱為手之所司。人身之氣，每日周行三百六十

五骨節以應周天三百六十五度血亦隨氣運行脈理以爲一身動靜云爲之主所以一脈冠和百脉皆病况風寒中人先入榮衛晝夜循環無所不至豈間斷于手經哉七日不愈而再傳者乃是經移熱傳于手經如冤家之相拂也雖然手經亦推本言耳上古止分三陰三陽而不分手足其意甚深况手足三陽同手足三陰同手足三陽同手足三陰同手足三陽同手足三陰同而走胃腹與手豈有經絡同而受病又有不同者哉卽如喘咳發熱分明手太陰太陽病也狂言譫語分明手少陰病也胃滿乾嘔耳聾分明手厥陰少陽病也認其五臟六腑俱有表裏二症入之情熱天之淫邪自然不齊故病多標本兼見使令脉弦面青目痛筋急善怒心下滿者兼肝有風也脉洪面赤口乾善笑身熱者兼心有熱也脉緩面黃身重肢疼者兼脾有濕也脉澀面白帶憂喘下痢者兼肺有燥也脉微面黑善恐耳閉氣逆而泄兼腎有寒也此邪出於外則爲腑爲表入於內則爲臟爲裏不拘何臟何腑表症必同歸於太陽裏症必同歸於陽明噫法無定用病有定體知此則百病機關一

指可了又何疑於手經之不受病耶

右一段論六經正病

(表)可汗而裏可下

表症屬太陽凡見頭疼發熱惡寒清便自調腰項脊強脉浮緊者即起表症不

拘日數多少便宜解表不宜下滲有汗為表虛宜解肌無汗為表實宜發汗但發汗亦有輕重不同古謂春夏宜汗者借天時而喻陽邪在外也其實春月陽氣尚微秋月陽氣欲收俱不可大汗夏月天氣熱玄府開不必大汗冬月陽氣伏藏感冒輕者尤不宜汗惟感寒重者時令嚴慄皮毛畢絀非大汗無由得散不得已而從權也至於陰症但厥無汗者妄汗動經則死或有表邪辛熱微汗以散之可也○裏症始焉脉浮而大今則沉而數始焉惺而靜今則躁而動始焉頭疼發熱惡寒今則不惡寒反惡熱煩躁倍加身連腰腹滿痛腋下掌心自汗微瀉以致胃氣黃躁大便不通小便赤澀口渴發在譫語掀衣揭被揚手擲足六味有力即是傳經熱症又謂陽盛誤汗即死或有初病即見此症者不拘日數多少便宜通利失下則血氣不通而發厥矣抑又有說焉純乎表而裏無一毫病者當解表時

勿攻裏純乎裏而表無一毫病者當攻裏時勿辨表如表裏俱見或表多裏少表急裏緩則先治其表而後攻其裏或裏多表少裏急表緩則先攻其裏而後救其表也又表虛裏實則藥宜辛涼裏虛表實則藥宜辛熱皆以裏為主內氣正而後可以治表雖莫急於內表亦不可緩也表裏虛實而醫之太分明矣

表裏半者宜吐與和

凡病或渴或不渴或胃中煩不煩或嘔不嘔或腹中痛不痛或咳或不下

悸或小便不利或有為之症少陽所主也邪在表則多寒邪在裏則多熱邪在半表裏則寒熱往來邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿邪在半表裏則胸脇滿邪在表則呻吟不安邪在裏則狂言亂語邪在半表裏則欲言不言邪在表則小便清而易邪在裏則小便濁而難邪在半表裏或利或不利邪在表則不煩不渴不嘔邪在裏則煩滿而渴故或煩或嘔者邪在表方傳裏也若見耳聾脇痛寒熱嘔而口苦胃脘脹滿脈見弦數者即足半表半裏脈大胃滿多痰者或按宿食可吐百問云氣浮上部填塞心胃頭痛多涎此吐症也內經云其高者因而越之脉雖大

無煩痰者不可吐只當和解古謂春宜吐者順陽氣發生於上也秋冬宜下者順陽氣收斂於內也此亦道其常耳有病皆

當從權

陽可寒而陰可熱經言之三陽經病即陽症手之三陽從

陰症足之三陰從足走腹故腹痛自利云云然陰陽俱有表裏二症陽症表裏同歸於熱而已陰症表裏似陽入裏則有傳經直中之殊太抵陽症之表發熱惡寒清便自調面光聲亮身息件來如常手足溫陽症之裏唇焦舌燥身甲紅活身輕易於轉側煩渴飲云揚手擲足大便或澀或鞭小使或赤或澀脉浮洪數宜汗吐下和四法以治之陰症之表無熱惡寒而條聲短鼻息件來氣冷手足厥逆陰症之裏唇紫舌卷爪甲青黑身重難於轉側不渴引衣卧多踞足太便秘利小便清自脉細微每與陽症相反蓋陽症自下而上故初起有煩疼陰症則無頭疼也陽症自外傳入故微而為熱陰症則無身熱而反厥冷也陽症蹠手擲足陰症則臥多踞足陽症內熱而渴陰症則不渴陽

症二便閉陰症二便清且利也惟有腹痛瀉嘔陰陽二症俱有然陰脈沈微凡言陽症多得之風寒暑濕邪生於太陽也凡言陰症多得之飲食起居喜怒邪生於少陰也故云傷寒挾內傷者上居八九此陰陽正病也

陰陽極

者從治非訛

陽邪不深不能至手厥逆陰邪不甚

水調之反化亢極則害之義也陽症潮汗秘赤滿渴狂譫甚則斑血喘急然熱極忽然熱伏於內故身寒四肢厥逆狀若陰症但身雖冷而不欲近衣神雖昏而氣色未潤脈必沈滑而有力此陽極似陰也宜大柴胡湯下之或白虎湯竹葉石膏湯陰症厥冷吐利不渴靜謐甚則咽痛鼻鼾然寒極忽然火浮於外發躁擾亂狀若陽症然身雖煩燥而引衣自蓋口雖燥渴而飲水不下脈必沈細無力此陰極似陽也宜通脈四逆湯從治者反攻也熱藥冷飲冷藥熱飲或熱藥為君而佐以寒藥或冷藥為君而佐以熱劑亦非判然如庸醫之差訛也借有熱病服熱藥而愈者必先服寒藥過多寒病服寒藥而愈者必先服熱藥過多故耳若夫以寒治熱以熱治寒此為逆治逆治者正治也正

治之法入孰
不知之乎

表裏俱結不可犯上犯下傷寒頭痛寒熱表也口失滋味

五日後以至過經十三日既無表症又無裏症身微熱者
虛熱耳小柴胡湯和之不可汗吐以犯上焦清氣不可大
下以犯下焦胃氣身熱日中不了了睛不和不便鞭者乃
可大柴胡小承氣下之設或已下而脉數煩躁善饑六七
日不大便者
瘀血症也

表裏俱有寒其熱少熱多表裏俱見必分多少治之脉浮

散主之頭疼身熱便閉為裏小便利為表桂枝湯主之
心滿不食便閉為裏惡寒頭汗為表小柴胡湯主之太陽
病因下早而協熱下利心痞鞭者謂之表裏不解桂枝人
參湯太陽病因下早而腹痛有積者謂之太陽太陰又謂
之裏傳表桂枝加芍藥湯甚者加大黃太陽病下早利不
止脉促喘而汗出表未解也葛根苓連湯脉弦芤滿者枳

豉湯吐之通治表多重少者白虎湯或合小柴胡湯裏多
表少者五苓散或合小柴胡湯表裏俱急者防風通聖散

大柴

胡湯

當汗而下則為瘀血懊憹痞氣結胸之患太陽症脈浮緊者宜汗而汗之

不解者再與汗之若失其汗則寒邪傳經當者傳過何經

變出何病若應汗而反下陰表邪乘虛內陷則熱蓄於裏

變為瘀血懊憹

痞氣結胸等症

當下而汗則為悸惕亡陽譫語厥竭之病裏症具而脈沉者宜下若下

後熱不退脈未和者猶當量虛實再下若失下則邪無

從出又或應下而反汗之則津液內竭變為動悸等症

不可汗諸虛咽瘡淋血壞症動氣與風溫風濕脈遲若汗

症全在表也然太早太過則津液竭而變生焉有不可汗

者諸虛損咽乾口燥咽痛瘡瘍淋瀝經水適至諸失血吐

沫咳喘症肺中上下左右動氣風溫風濕濕溫脈遲微
清弱或厥而脈緊者俱宜和解不宜汗若強發之病微者
難痊刺者言一
亂目眩而死

不可下諸虛咽腫嘔厥結脅動氣與脈浮脈虛帶表者脈

症全在裏也然太早太過則水穀脫而變生焉有不可下
者諸虛咽腫嘔吐厥逆建胃不轉失氣膈中左右上下動
氣脈浮而微者皆表惡寒等症
下之則危隨宜以溫熱藥救之

陰虛挾火而脈微不可灸之者消及口和背惡寒脈微瀯獨

陽虛者宜灸陰虛挾火脈微數者不宜灸蓋外火能助內
火火炎則下體必重痺骨焦肉消或因此遺精潮咳見紅
皆火氣之所使也活人云凡灸後燒針後症
與火邪發狂者同小柴胡加龍骨牡蠣治之

膈寒肢冷而脈微不可吐之者灸
膈上寒飲乾嘔少陰病也
四肢冷胃弱也脈微下虛

也誤吐內煩損傷元氣遂致不救者有之若應吐而反溫之則毒氣鬱結於胃而為發狂等症

急下以救水存液之機甚微傷寒熱氣入臟流於少陰之經咽嗑焦口燥渴腎水乾也

熱病熱不已目睛不和亦腎水乾也皆急下以救腎水陽明發熱汗多或已汗不解腹滿痛及狂譫不大便者皆急下以存胃液傷寒脈弦而遲弦為寒遲為臟脈大而緊大為陽緊為寒俱謂之陽中伏陰急下以分陰陽又下利三部脈平心下硬者內實也下利脈遲而滑或浮大按之反

濡惡食者皆胃有宿食也但宿食忌巴霜只宜大黃瀉之

急溫以和陽止嘔之功非小時脈沈厥冷脈上寒欲嘔或時頭痛皆寒氣上攻也急溫

之三味參黃湯內寒已極厥逆吐利不渴靜謐陽和之氣欲絕六脈若有若無急溫之四逆湯凡言急者病勢已篤

將有變革非若他病可以緩也他如太陽汗出不止汗後惡風汗後煩躁心悸身痛皆宜急用附子加於桂枝方藥

之類三陽脈運腹痛建中湯當先施之也但一服中病即止傷寒之藥皆然

過經不解汗下從輕

傷寒六日傳經一遍七日當解再傳至十三日以上不愈謂之過經汗下失

宜以致邪氣留連不已神昏譫語目滿潮渴隨其表裏症

見而調之或從輕再汗再下如脉亂發躁尺寸陷者危如

脉緩身雖邪未淨者正未復耳參胡芍藥湯調之有大便

下利而脉和者知醫以九藥下之停留餘熱九過經氣虛

或加異氣宜汗

與壞症參看

尺遲難補何忌

凡尺寸遲弱血少也不問風寒初症雜症俱忌汗吐下宜先以小建中湯或黃芪建

中湯救脉如素實者小柴胡

湯亦好俟脉不遲方可施治

發表攻裏溫裏之方扶陽助陰抑陰之義

此陰陽指表裏言病者為虛下

病者為實表病裏和則邪出於外而為陽虛陰虛故發表

不遠熱而用辛甘之劑所以扶陽也裏病表和則邪入於

內而為陰虛陽盛故攻裏不遠寒而用酸苦之藥所以扶

陰也若陰經自受寒邪則為藏病救陰陽氣將脫急宜辛

熱回陽抑陰故曰桂枝下咽陽盛則驚承氣入胃陰盛乃亡實實虛虛損不足而益有餘醫殺之耳此汗下之桴機也

法以得中為貴不及愈於太過法謂汗吐下溫解五法各有不同汗有大汗發表微

汗解肌以別輕重下有急下少與微和滲利以分清濁溫

有兼補者吐有宜瀉探引或只寬利而不敢吐者和解則

一而它或曰傷寒無補法熱氣得補復盛更復下之是也

困也惟虛與裏寒陰症不在此例得中者五法洞中懸刺

太過者雖上猛進不及中工從緩從輕凡傷寒汗下藥

一服中病即止不必盡劑與雜病不同傷寒不過牙吐下

三症非用之得中者有何傳變

全在醫者精明審度之耳

症有似是而非不知寧可不治有傷寒五日未定之時不知有無風濕勞役痰食等項

相兼似是而非最宜詳辨故不知者寧可不治班固有三

日有病不治得中醫倘一藥之誤悔將噬臍噫古以醫藥

救天札今以醫藥治其生治生可也而誤

人於死豈不與謀劫者同哉慎之慎之

右一段論表裏陰陽汗吐下溫解五法

傷寒惡寒無汗而手足微冷

霜降後春分前人有傷風之道途履霜踴水冒犯寒氣即發

為病名曰傷寒必先惡寒頭痛甚鼻無涕其聲前輕後重口中不和雖不食亦不惡食手足不熱病深重者必身痛發熱冬月麻黃湯輕淺者陶氏麻黃湯虛者人參順氣散三時差活中桂湯小柴胡湯通用麻黃杏仁飲此專辨無汗為傷寒蓋風暑濕皆有汗惟寒無汗血無汗至於初症傳變雜症俱詳後段

傷風惡風自汗而手足微煩

傷風初症惟頭疼口和不惡食與傷寒同緣寒乃陰邪風

乃陽邪所以傷寒鬱而後能發熱傷風即能發熱傷寒手足微厥傷風手足背背熱傷寒鼻無涕傷風鼻流涕其聲逆自變中出傷寒面陰身痛傷風面光身重傷寒無汗惡寒不惡風傷風有汗惡風不惡寒甚者自汗出不止洒洒惡風復齬齬惡寒冬月桂枝湯自汗小便數者芍藥甘草湯自汗小便利脚蹠急者桂枝湯加參附輕者柴胡桂枝

湯自汗渴而小便難者邪熱傳裏五苓散自汗不渴者邪
在表茯苓桂枝湯三時防風沖和湯柴胡桂枝湯或敗毒
散去茯苓鼻塞通關散通用柴胡半夏湯古立六經傷風
方見後桂枝湯下但三陰藥皆辛熱似非傷寒家法仲景
治傷寒傷風表症分有汗無汗裏症同於和解通利更無
分別今詳桂附八物恐亦因邪直傷陰分其人素虛或房
室後傷風則可若驟作表藥誤人多矣蓋傷風發表辛熱
不如辛溫辛溫不如辛涼也或疑六淫仲景獨詳於風寒
而畧於暑濕且不及燥火何也蓋暑火同氣燥濕同源風
寒傳變六經暑濕性偏著人五臟壯者氣行則已怯者乃
著為病故耳前所謂蓄蓄不足之
也洒洒然也皆惡風之貌

治表裏急治裏表急陰同于陽為兩感
兩感者半入於陰陰陽兩

感臟腑俱病一日太陽與少陰俱病頭疼為太陽邪盛於
表口乾而渴為少陰邪盛於裏二日陽明與太陰俱病身
熱語語為陽明邪盛於表不欲食腹滿為太陰邪盛於裏
三日少陽與厥陰俱病耳聾為少陽邪盛於表囊縮而厥

為厥陰邪盛於裏也五臟六腑俱病欲治表而裏急欲治裏而表急必死之症但稟氣實而感邪淺者或挾異氣風溫風濕之類猶可救療所以仲景有治有先後發表攻裏之說法當審其表裏緩急虛實何如如表裏俱急者大羌活湯主之如陽症陽經先受病身體痛而不下利者為表急先以葛根湯黃發表後以調胃承氣攻裏如陰症陰經先受病身體痛而下利不止者為裏急先用四逆救裏後以桂枝救表陰陽未分者附子中和湯探之古法一日太陽少陰五苓散主之頭痛加羌活防風口渴加黃芩知母二日陽明太陰大柴胡湯三日少陽厥陰危甚大承氣湯加川芎柴胡救之活人不分陰陽專用四逆桂枝先輩皆以為謬大抵兩感脈從陽可治從陰難治

傷風見寒

傷寒見風脈不合症而相反

先傷寒而後傷風者症傷寒也而見

傷風之脈先傷風而後傷寒者症傷風也而見傷寒之脈此乃榮衛俱實故無汗而煩躁大青龍湯不煩躁者桂麻各半湯通用大羌活湯九味羌活湯加人參大棗或神木散香蘇散

三陽合病自利而汗下審在經入府或一陽先病一陽隨

陽同病不傳者謂之合病○自利者下利溏泄三陽合病

寒邪甚而裏氣不和也氣行下則利氣逆上則嘔太陽合

陽明自利惡寒者升麻葛根湯惡熱者白朮湯太陽合少

陽自利者黃芩湯嘔者並加半夏生姜陽明合少陽自利

最重小柴胡合升麻葛根湯○有宜下者本太陽病因汗

下液亡津液胃府燥實轉屬陽明謂之太陽陽明脾約丸

潤之本少陽病因汗液熱入胃府大便燥者大柴胡微下

之本陽明經病熱盛傳入胃府謂之正陽陽明乃本經自

病也宜調胃承氣湯從中治之蓋太陽少氣少陽少血惟

陽明居二陽之中氣血俱多所以從中治陽明而不敢犯

太陽少陽也又三陽合病面垢腹脹痛身重難轉側諸語

遺溺口燥不仁大便難者白虎加參湯主之不可汗下亦

中治法也○有宜汗者表症頭疼惡寒未陰為太陽尚未

過經尤宜發汗如太陽陽明喘而胃滿者麻黃湯太陽少

陽麻黃湯合小柴胡湯通用九味羌活湯加

石膏知母枳殼蓋在經則汗過經則下也

三陽併病可汗而攻通必傳胃歸脾

併者催併逼迫之意始初二陽合病後一

陽氣盛二陽氣衰併歸一經獨重初症亦不解罷陽明併
太陽者太陽症未解陽明症又至麻黃湯合升麻葛根湯
如太陽症重加大陽經藥陽明症重加陽明經藥後做此
少陽併太陽者大陽症未解少陽症又至麻黃湯合小柴
胡湯頭痛項強眩冒如結胸狀者亦宜通用九味羌活湯
少陽併陽明者為木尅土難治小柴胡湯合升麻葛根湯
柴胡升麻湯救之是併病在表者皆可汗若太陽症罷乃
入胃府者謂之傳經非併也宜量體攻下舊云三陰無合
併二病然三陰亦有自相合併者但
非兩感必無陰經與陽經合併之理

但聞疫癘能傳染

疫疾如有鬼厲相似故曰疫癘又日時氣春應緩而反清夏應熱而反涼秋應

涼而反太熱冬應寒而反太溫非其時而有其氣凡感之
者皆發頭疼身痛寒熱一方長幼病皆相似治與傷寒微
異者春清黃肝升麻葛根湯夏熱黃心二香散調中湯秋
濕黃肺白虎加蒼湯茵陳五苓散冬寒黃腎姜糖湯甘桔

湯土平四季隨經取之治與傷寒同者表症敗毒散半表
裏小柴胡湯裏症大柴胡湯按內傷者宜補宜散宜降人
中黃丸是也經曰疫氣不拘於診更當於運氣求之凡入
疫家用麻油服之或煎麻油并雄黃硃砂未探入耳
鼻內最能避惡毒之氣通
滿鄉村善用如意丹亦妙

豈知正氣亦多惑

經曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清爽冬
氣凜冽以傷寒為毒者以其最成於厲

之氣也其有傷於四氣留在何經而發何病大抵春傷於
風夏必發也夏傷於暑秋必瘧痢秋傷於濕冬必咳嗽冬
傷於寒春必發瘧疫者二日一發瘧者一日一發秋傷於
濕不即發者及冬風寒相搏來而生而為咳嗽冬傷於寒
不即發者及春溫氣相搏變為溫病是四時正氣亦多惑
和如此皆因發動之時並推致病之源非受傷之時擬
今日之病故有久而消散不成病者豈可執一論哉但
覺氣淫於內心腹不快者不換金平氣散加我以正胃氣
春變為溫夏變為熱溫病者春分後有太陽病發熱咳嗽
身痛口渴不惡寒其脉弦數不緊右

手反盛於左，手蓋拂熱在內，故也。或散在諸經，各取其經而取之。熱病即與溫病同，但發在夏至後，脈洪數熱渴更甚耳。雖因冬時受寒，伏於肌骨，然人身隨天氣化，春分則寒變為溫，夏至則寒變為熱，所以傷寒惡寒而不渴，溫熱不惡寒而渴。乃復還裏，終是裏多，表少間有惡寒者，乃胃非時暴寒，或溫暑將發，又受暴寒，非冬症之甚也。法當治裏熱為主，而解肌次之。亦有專治裏而表自解者，誤下猶可。誤下則變為嘔、噎、狂、斑，而死。蓋溫熱在經，而不在表，安可例用傷寒汗法？惟暴寒者，乃可表裏雙解，亦不敢用。冬月辛溫之藥。○春溫表症，天溫升麻葛根湯；天寒柴胡桂枝湯；太陽合少陽敗毒散；合小柴胡、太陽合陽明敗毒散；合升麻葛根湯；陽明合少陽升麻葛根湯；合小柴胡湯。半表裏小柴胡裏症，太柴胡重者，一時表裏俱發，防風通聖散表裏俱熱，大便自利者，紫雪湯。加山梔、木通、犀角、竹葉、石膏湯。變雜症悉同傷寒。○夏熱表症，太陽九味羌活湯。汗後煩渴，脈洪大，背惡寒者，白虎加參湯。益元散裏症，太柴胡重者，一時表裏盛發，雙解散熱病，脈細無力，足冷已。

得汗而發盛者此陰脈之極也必死詳溫暑門

晚發疑為秋病

質諸高明

先輩云清明至夏至前太陽病

以感之輕者發之早感之重者發之遲從立秋至霜降有患太陽病者亦各溫病治法同溫熱但加燥劑於解肌藥中重者症一曰同傷寒但既以三月至夏至為重發春分前又為正傷寒少知春溫在於何月更考三月至夏至前各為春溫則晚發當屬於秋矣立秋前後病者因熱熱而發處暑後病者因燥熱而發庶乎四時六氣備而不混而治之各隨其時耳太繁表症九味羌活湯梔子升麻湯重者症大柴胡湯加生地或導滯通幽湯變雜症者隨宜施治

冬溫總是時行加乎調燮

冬有非時之暖名曰冬溫與春

傷寒相似但脈不浮耳治法大同春溫表症萎蕤湯九味羌活湯入裏加大黃重者雙解散輕者加減調中湯

靜而得之為中

暴動

而得之為中

中

中

暑暈皆自汗煩渴脉虛面赤昏倦靜而熱

傷心脾為中暑與夏熱病相似但熱病脈洪緊中暑脈細
數而沈動而熱傷太陽為中暈脈浮似夏傷風但汗出惡
風身熱而不渴者傷風也汗出惡寒身熱而渴者中暑也
加之身痛且重者必夏月傷冷或濕冷水行皮中所致○
中暈心腹疼痛霍亂吐瀉轉筋甚則發厥昏悶香薷散痰
逆惡心惡寒者橘皮竹茹湯汗多渴而不惡寒者竹葉石
脂湯暑熱相搏身痛頭痛煩渴惡心尿赤者五苓散濕盛
留滯者瓜蒂散吐之若小便已洒然毛聳口開前版微燥
黑肢厥小勞身即熱者表裏俱病也白虎加參湯有汗者
白虎加蒼湯和之切忌汗下針灸汗則惡寒下則內虛變
淋灸則助火發熱○中暑發熱煩躁口渴者小柴胡湯加
香薷瀉利口渴者香薷散合四苓散元氣素弱脈虛身倦
者清暑益氣湯昏憤
不甦者葱餅熨臍

暴寒寒疫與伏藏已變之寒自是情違春分至秋分暴寒

寒北也三月四月或有暴寒陽氣尚弱為寒所折病熱猶
輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽

氣已衰為寒所折病熱亦微傷之者其病與溫暑相似而治則殊者蓋溫暑伏寒自內而發寒發自外而入宜調中湯為主隨時氣候寒熱輕重而以辛涼辛溫之藥加減蓋折者折抑陽氣鬱而為熱也感之輕而陽氣不為所折未至發熱者當於感冒藥中求之

暴溫溫疫與過經不除之溫皆難汗發

春三四月間暴熱傷之者亦溫病

傷寒汗下過經不解者亦各溫病但當隨各經見症治之皆不宜汗下暴溫梅子外麻湯九味羌活湯過經和緩散參胡芍藥湯

風溫喘渴多睡四肢不收若癰

太陽病發汗則身涼如發汗身獨灼熱者乃風溫也

當春溫氣大行又感風邪所致惟風傷衛四肢緩縱不收若癰痲然惟溫傷氣氣昏而鼻息不利語音蹇澀身熱自汗多眠治在心火肝木二經忌汗下針誤汗則身必灼熱甚則煩渴譫黃下則遺溺針則耳聾惟清解肌表為佳宜

萎蕤湯敗毒散或小柴胡加桂枝微汗之渴甚者以蔓根湯痰喘者金沸草散加杏仁細辛五味子設汗防已黃芪湯救之謔語獨語及直視遺尿者難治

濕溫冒滿妄言兩脛逆冷如雪

夏月先傷濕而後傷暑名曰濕溫濕與熱搏兩脛逆

冷甚則遍身亦冷冒滿頭痛壯熱自汗若再發汗令人嘔

孽身變青色不語名曰重暈必死治在心火脾土茯苓白

朮湯濕勝溺澀便利者五苓散除濕湯臍滑者木附湯暑

勝壯熱二便澀者香薷散六和湯便閉渴謔白虎加蒼湯

風濕頭汗身重而大便難先下受風濕而後傷風風先上受濕

在內大汗則其氣暴而內邪不能出故風去而濕存濕流

入裏則病重微汗則其氣緩而內外之邪俱去或濕症去而風症未去者不久自解寒熱身痛麻杏薤甘湯體痛發熱小便不利麻黃湯加蒼朮肩背脊腰強痛者若活勝濕湯腫痛微喘杏仁湯汗多穢防已湯虛者身重難以轉側桂枝湯加白朮身重昏迷自汗失音下利不禁者白通湯

加白朮甘草身痛小便不利者甘草附子湯身重走痛者
小續命湯去麻黃附子熱而重痛煩渴者敗毒散去柴胡
人參加瓜蒌根小便自利及下利不止者死

寒濕頭汗身痛而大便泄傷寒無汗寒濕相搏而有汗不
能通身惟在頭耳身背強者表

不利也症與風濕相似陰濕湯主之帶衣五積六
加散裏寒理中湯加附子寒多浮腫木附湯妙之

中濕二便垂而黃熏於肌膚濕即水也東南窓下風雨襲
虛山澤蒸氣人多中濕濕在

經則日晡發熱鼻塞在關節則一身盡痛在臟腑則清濁

混而大便濡泄小便反澀腹或脹滿濕熱搏則遍身黃如

熏色輕者面自微黃而已誤下則為喘噦誤汗則發狂而

死惟利小便為佳五苓散除濕湯主之小便不利大便反

快者甘草附子湯二便利不發黃者木附湯身痛鼻塞者

黃芪建中湯中氣堅滿癰閉者枳朮湯加葶藶發黃見後

濕痺三氣合而痛歷乎關節痺者痛也太陽病脉沉而細
關節煩疼皮膚麻木自汗者

防已黃芪湯無汗者五積交加散主之然濕氣四時有之
兼風兼熱兼寒者隨症加減濕病古云三種實亦五種

寒濕重感成

痙

發時可驚

大陽病純傷風純傷寒則不
發痙惟先傷風而後又感寒

或先傷風而後又感濕過汗俱能發痙重發大陽汗大發
濕家汗皆能發痙外症寒熱類傷寒但脉沈遲弦細搖頭
露眼口禁手足搐搦項強背反張如發痙一終日不醒為異
風性動為剛痙因重感寒或冬故無汗宜葛根湯加羌獨
活防風濕性緩為柔痙因先傷風故有汗宜桂枝湯加天
花粉葛根其或痰塞氣盛則南星半夏白茯苓以消痰枳實
陳皮紫蘇以順氣痰消氣順然後分剛柔治之通用小續
命湯有熱去附子自汗去麻黃剛痙二三日仰面壯熱胃
滿如結胸狀便閉脚蹠卧不着席者太承氣湯下之輕者
敗毒散小柴胡湯柔痙二三日不痙汗多厥冷筋脉拘急
者附子防風湯時發時止危者附木散又有剛柔不分之
痙身熱證語似剛微厥便滑似柔宜小續命湯加生附子
有汗下後乍靜乍燥偏左眼左手足牽搐者少陽痙也小
柴胡加防風又血虛之人及痙後傷風過汗破傷風症發

痊俱不可純作風治四物湯加防風或八物湯去茯苓
黃芪羌活防風救之凡瘧疾如雨戢戢出指外者立死又
戴眼反折瘰癧汗出如珠或反張離席一掌許小
兒離席二指許者皆死風熱痰火瘧瘵見雜病

寒氣重感變溫瘧發久則截傷寒汗吐下後餘熱未淨重
感於寒而變瘧或過經舊熱

未解新感六淫之氣而變瘧皆曰溫瘧者俱先熱後寒故

也寒多熱少或單寒者太陽邪變也柴胡桂姜湯熱多寒

少或單熱骨節煩疼者陽明邪變也白虎湯加桂寒熱相

等或先熱者少陽邪變也小柴胡湯渴者去半夏加天花

粉知母寒熱大作戰慄汗出不散者太陽陽明合病也桂

枝石羔湯服此後瘧愈甚者三陽合病也恐傳入陰經急

用桂枝黃芩湯如傳入陰分從卯至午發而嘔吐大便閉

者大柴胡湯下之從午至酉發而腹滿便閉者大承氣湯

下之從酉至寅發而欲狂喜忘便黑者桃仁承氣湯微利

之不數下者梔子升麻湯傷寒與雜病瘧不同在此間有

挾痰與食積嘔吐不食者二陳湯對金飲子尿瀝煩渴或
因瘧氣不伏水土者五苓散俱加黃芩柴胡此等瘧與雜

病無大異日夕勢發稍緩則截之痰飲在上膈欲吐不吐
者小黃芩赤小豆雄黃等分爲末水調五分服之以吐爲度
或祛邪丸亦好久不愈者
勝金丹老瘡丸以消之

霧露中於下焦名曰渾霧露中於上焦名曰縈霧露濁邪

中於下焦少陰之分故曰渾因表虛裏微遂使邪中於陰
爲慄令人足脛逆冷便溺妄出或腹痛下利宜理中湯四
逆湯熱藥以散其邪陽脉緊或帶瀉者霧露清邪中於
上焦太陽之分故曰縈令人發熱頭痛項強頸攣腰痛脛
酸宜九味羌活湯加藁本或惡寒欲吐者藿香正氣散五
積散仍量加藁本陰陽脉俱緊者上下二焦俱中邪也
必吐利後脉不緊手足溫則愈若吐利後脉遲不食者脾
胃虛而內停水飲也若脉陰陽俱緊口中氣出唇口乾燥
蹇卧足冷鼻涕出舌上胎滑勿妄治也又有陽病上行極
而下陰病下行極而上上下下必于中焦於是三焦渾亂內
外氣塞以致上爲口糜咽噎下爲小便黃大便血凝如猪
肝熱氣勝而脾胃不運榮衛凝滯則生瘡癰虛寒甚者脾

胃獨弱下焦不約清便下重臍築痼痛而死蓋臍為生氣之源築痛生氣已絕

水症多嘔咳而頭汗唯在表也則身熱而心胃怔忡惟在

裏也則身涼而脇腹滿堅水陰也寒也或因飲食生冷或因洗浴過度內熱者得之即自

消燦內寒者得之即自停蓄傷寒表熱與水氣相合皆發熱怔忡乾嘔喘嗽小腹滿小便不利小青龙湯半表裏症

但頭汗出身無大熱心下滿揉之汨汨有聲者謂之水結胃小半夏湯甚者大陷胃丸下之或傷寒厥而心下悸乾

嘔詭逆者茯苓桂枝甘湯赤茯苓湯裏寒與水氣相合者四肢疼痛腹痛嘔泄小便不利文武湯甚則成癰脇鞭者十

棗湯表裏俱見渴欲飲水水入即吐者各曰水逆五苓散

參之若病在陽宜汗而反以水嚥面閉熱肉上粟起欲飲水而不渴者單用文蛤為末沸湯調服方寸匕流入皮膚

浮腫者牡蠣澤瀉湯五苓散防已黃芪湯木附湯選用

黃症俱口渴而頭汗黃熱發者則溺澀而大腹脹膨蓄血

發者則溺清而小腹急結經曰濕熱相交民病痺痺即黃

卑陽而無陰也傷寒發黃雖不

一皆因內熱而誤用溫藥或被火攻太甚或失汗下與滲
以致陽明經中血熱而見真色於肌膚謂之瘵熱發黃頭
汗作渴小便不利色黃而明茵陳湯茵陳三物湯陶氏茵
陳湯有濕熱鬱而發黃者身痛發熱色黃而晦茵陳五苓
散有寒濕發黃者太陽病寒濕在裏發汗過則寒去而濕
在麻黃連軀赤小豆湯身痛鼻塞者急用後瓜蒂搐鼻法
內服茵陳五苓散頭痛甚者神木散加茵陳有中濕發黃
者一身盡痛誤汗則眼目俱黃茵陳五苓散梔子柏皮湯
防已黃芪湯身體煩疼者麻黃湯加蒼朮有傷風發黃者
易饒鼻乾腹痛潮熱咳嗽小柴胡加茵陳如瘵加茯苓甚
者用大柴胡加之往來寒熱者小柴胡加山梔茵陳有內
傷中寒發黃者脾胃素虛或傷冷物停滯不散或嘔逆腹
滿或太便秘自利理中湯加茵陳枳實青皮腹脹食不敢飽
欲作穀疸者五苓散加茵陳有陰症發黃者四肢逆冷脈
沈或陰盛發躁四逆湯加茵陳有結胸發黃者心胃滿鞭
拔之痛不可近太陷胃湯加茵陳有痞氣發黃者心下滿

類按之不痛半夏為心湯加茵陳痞結消則黃自愈太抵
發黃與陰濕相似輕則淡利和緩重則大下水利黃自退
矣非但寸口無脉鼻氣冷為不治形變煙薰黑色搖頭直
視環口鰐黑柔汗發黃脾臟氣絕也凡初發黃先以口含
水用瓜蒂末一字搐入鼻中吐出黃水內服茵陳五苓散
或酒蒸黃連丸外用生姜同茵陳搗爛遍身擦之諸發
黃皆小便不利惟瘀血發黃小便自利且瘀血與瘀熱外
症俱頭汗依渴脉浮數但熱結下焦則熱耗津液而小便
不利血結下焦則熱但耗血而不
耗津液故小便自利治詳後瘀血

右一段論正傷寒名義

曰傷寒曰傷風曰傷風見
寒曰傷寒見風曰合病曰

併病曰兩感曰中霧露曰中暑曰熱病曰晚
發曰瘧瘵五種濕病風濕濕溫寒濕中濕濕痺
五種溫病春溫風溫溫疫溫瘧溫毒發瘕附水
症黃疸乃傷寒之太關鍵也故并提之共二十
四種濕溫居半可見
見濕熱為病最多

虛煩頭身不痛無寒而脉鮮緊

虛煩者七情六慾以致心火虛而心火煩燥或雜病

後餘熱未淨而煩或勞後氣衰火旺而煩或陰虛相火動而煩有類傷寒初症外亦發熱但頭身不痛脉不緊數為異雖陰虛亦惡寒而不甚脉亦能數而無力太藥病後虛少氣煩燥欬嘔者竹葉石膏湯輕者小柴胡湯痰逆惡心者橘皮竹茹湯陰症內寒外熱肢節痛口不燥而虛者陰旦湯服涼藥後脉愈大而無力熱愈甚而燥渴者單人參湯或人參黃芪煎湯下五苓散帶役氣虛者補中益氣湯參虛者四物湯加知母黃柏脾胃弱者三白湯驚悸痰盛者溫膽湯心神不安者硃砂安神丸婦人新產血虛煩者四物湯加人參淡竹葉麥門冬甘草表虛已汗重虛寒起若用傷寒汗下重劑而治虛煩重則津竭而死輕則內消盜汗變為癆瘵傷寒有未經汗吐下而煩者胃滿煩實煩熱有已經汗吐下而煩者胃滿煩燥燥懷見各條

痰症

頭項不痛寒熱而寸多浮

痰者津液所化風傷肺傷脾凝滯而生外症頭項

皆和寒熱類傷寒耳初起便胃膈滿悶氣上衝咽寸浮
為異有熱者參蘇飲金沸草散柴胡半夏湯無熱者二陳
湯溫膽湯通用導痰湯有痰結胃者鶴頂丹枳
椗二陳湯有痰上攻非次頭疼者小蘇散吐之

食積心腹痛悶

外症頭疼發熱惡寒全類傷寒惟身不痛
心腹飽悶噯噎嘔逆右脉弦盛為異耳

症云頭疼而惡心身不痛者食積也頭疼而身亦痛者傷
寒也食在上脘胃痛惡心欲吐實者瓜蒂散吐之食在中
脘痞脹欲嘔有熱者二陳湯黃連生薑烏梅或陳氏平
胃散腹痛欲瀉者胃苓湯寒者治中湯心腹滿痛不大便
者大柴胡湯下之○又有夾食傷寒謂之太陰積症表症
藿香正氣散或五積散去當歸麻黃加人參蘇葉有表復
有裏者桂枝加大黃湯表症已罷但裏實滿者小承氣湯
凡傷寒下後六七日不大便煩熱腹滿而痛胃中有宿食
故也若中寒夾食即見吐利厥逆霍亂等症急用理中湯
加枳實或四逆湯救之凡夾食脾胃已傷不可輕易汗下

脚氣膝脛軟弱

脚曰氣者風寒暑濕四氣蒸於足循經入
臟之深而發則以漸非若四氣中人雖淺

而繫也外症全類傷寒且有六經傳變一如太陽頭疼身熱云云直至厥陰煩滿囊拳又有合併二病但初起即感軟弱頭痺轉筋赤腫為異耳如太陽症見外踝節京骨至小指外側皆痛者隨四氣湯發散麻黃湯加防風羌活細辛葛根白朮茯苓防己或敗毒散全續斷散湯明症見解諸外藥下人中指內痛者隨四氣湯發散微利大柴胡湯如前法如辛杏仁或升麻葛根湯如前法如前症見諸足指節痛者宜和餅小柴胡湯去參加防風葛根細辛白朮或麥門冬乾姜小草三陽合病拘攣便閉者合前三方如瘧而服名左經湯或導入足太陰經症見股膝內廉足太陰帶內側痛或浮腫者古桂附湯加防己白朮茯苓少陰經症見足小指下連足心廉股內痛衝胃不食面黑弱法小腹不仁者難治八味丸救之厥陰經症見足太指連內廉臍腹脹痛脚攣乾嘔者養真湯如足三陰經痺緩弱上攻胃脘肩背下注脚膝足心熱者養真湯如足三陰經痺入肝積筋走注脉浮無汗小續命湯加獨活風毒腫痛非用續命散筋急掣痛乳香定痛散濕多入脾者肉重者行步之倒或腫除濕湯痰多者用此湯吞青州白丸子者

多入心。病氣喘悶煩躁，所患必熱。敗毒散加大黃寒多入腎，病骨痛急，製痛所患必冷。五積散越婢湯加木瓜，通用千金續命湯流氣飲子烏藥順氣散，煩燥者單用懋飲之。便閉者三和散脾約丸毒氣衝心作痛者蘇子降氣湯下。養正丹或吳茱萸湯刺入姜汁救之。死在旦夕，尋常春夏檳榔散加川練子熱腫赤者敗毒散加木瓜蒼木。秋冬五積散加木瓜檳榔牛膝吳萸最忌。神湯淋洗草藥難全其症有因於氣因於飲食及丹石者不可不若。

瘀血昏忘，如狂，胃脘小腹不快。血乃人身何處貴流通而

液內滲，或不當汗而汗，津液內竭，或利小便便過多，以致血熱化為惡痰，又或其人素有跌撲閃挫，善思善鬱，過食煎炒，以致血熱痰滯，蓄於上焦則衄血善忘甚，則昏迷良久乃甦，或曾脇腹皆滿痛，譫語昏憤，謂之血結胃症，蓄於中焦則頭汗作渴，發黃蓄於下焦則如狂，便黑小腹急結，按之則痛，其脉必弦，滿外症寒熱全類傷寒。太陽症則如狂，陽明症則善忘，少陽症則寒熱似瘧，大柴胡治上，犀角地黃湯治中，桃仁承氣湯治下，抵當湯尤然。必症重脉數方可。

此當攻之症輕脈微通用犀角地黃湯加青皮芩連木黃
或小柴胡湯加桃仁生地兼施子茵陳一切血症皆此治
法不易傷寒有用承氣大下不解反便堅善食者瘀血也
凡病日輕夜重便是瘀血所以打撲傷損症亦類傷寒

瘡毒飲食如舊掀發腫痛可求
凡患瘡毒初起寒熱全類

傷寒但傷寒不食瘡毒飲食如常且身有紅腫掀痛處可
證不可妄施汗下宜外科法治之○俗呼流注傷寒流者
行也注者住也血氣流行遇寒邪則凝滯結如堆核大者
如拳小者如李初起寒熱全類傷寒未潰者宜敗毒散合
赤膈散加金銀花已潰者托裏散不可作正傷寒治之○
俗呼赤膈傷寒膈赤腫疼痛寒熱類傷寒非正傷寒也
宜劑防敗毒散合小膈胃
湯裏實者防風通聖散

痘疹死足當時冷

凡初得及年長之人忽類傷寒症如未
患痘疹死足中指皆冷宜從痘症初熱

條治ス
之ヲ

勞發痰火待日過

素有痰火遇有勞動便發寒熱全類傷寒輕者將息過日自愈重者頸腋膊臑

之間遂結核腫硬或消下次遇勞又發
治宜八物二陳湯加降火和餅之藥

外感疎泄勿甚

舊謂傷為中感胃為傷今悉分之正恐人

感寒雖亦惡寒而後其頭疼發熱不如傷寒之甚脉多沈遲感風雖亦惡風鼻塞其發熱等症亦不如傷風之甚脉多浮數太繁未發熱者感寒香豉散感風蘇眉湯古之散已發熱者九味羌活湯之類熱服肌體微潤即愈尋常體薄多疾之人只於原服藥中加生薑陳皮一或寒用二陳湯風用三白湯加減詳見雜病

內傷補益兼投

外感挾內傷者素冒風寒未發加之飲食勞倦觸動外症全類傷寒但左手人迎及

關脉大於右手氣口一二倍此外感重而內傷輕也治以九味羌活湯去蒼朮生地用白朮隨六經見症加減如內傷脾胃外感寒邪者藿香正氣散人參養胃湯如內傷飲食外感風寒者平胃散加黃連枳實便閉加桃仁大黃如

內傷生於外感風寒者五積散。○內傷挾外感者先因飲食勞役過度身痛腰腿酸軟而其體已解休又感冒風寒外症全類傷寒但右手氣口及關脉大於左手人迎一二倍此內傷重而外感輕也治以補中益氣湯或調中益氣湯隨六經見症加減誤作傷寒大發其汗者死。○內傷房室又感冒者玉屏風散或加桂枝白芍內傷房室又感冒者川芎湯風寒兩感者玉屏風散合川芎湯體薄者通用十全大補湯少加防風羌活細辛白芷肢冷者加姜附陰虛者不物湯加陳皮炒乾姜不可誤用風寒燥藥愈虧腎水。○內傷虛損四肢無力發熱亦類傷寒但必蒸盜汗遺精白濁為異內傷衝虛惡風榮虛惡寒亦類傷寒但居密室則不惡也內傷陰虛火動惡寒非寒惡熱非熱但體清瘦脉無力為異內傷大渴體熱脉洪大似陽明中熱白虎症但脉無力耳內傷長夏困倦似外感濕熱或發熱頭疼似溫暑病已上俱宜補中益氣湯或四物湯四君子湯加減詳內外傷辨及雜病各條。○解休出內經解者肌肉解散休者筋不束骨其症似寒非寒似熱非熱四肢骨節解散怠情煩疼飲食不美或因傷酒或中濕或感冒風寒或

房事過多或婦人經水不調似砂病而實非砂也治宜通其氣血疎其腠理以內傷兼外感藥調之輕者從俗割砂刺十指及委中血砂症類傷寒見雜病盡瘡

右一段論類傷寒名義

舊以麥飯虛煩脚氣食積瘡毒涼血勞發瘧疹八症

大類傷寒新增感冒勞傷共成十症要之百病皆類傷寒不可不知

正類傷寒如斯傳變傷寒何謂耳聞傳陽則潮熱汗便閉

溺澀腹滿口渴發狂譫語甚則發斑嘔血喘急能升墻屋

變陰則厥冷吐利不渴靜謐甚則咽痛鄭聲欲坐井地請

以初症言之

頭痛二陽所主而濕痰鼻塞胃煩

太陽表症頭痛自巔頂連兩額太陽穴者分有

汗無汗治之若頭痛如破者急用連翹葱白湯葱豉湯陽明裏症嘔
明表症額痛連鼻日齒痛根葱白湯葱豉湯陽明裏症嘔
熱汗多頭痛者調胃承氣湯陽明症汗多煩渴脉洪頭痛
者白虎湯加白芷少陽症頭角痛連耳往來寒熱者小柴
胡○濕家鼻塞聲重頭痛者今病人先飲水一口勿熱次
將瓜蒂散一字入鼻內搐出黃水為度○痰涎頭痛難當
胃膈煩滿欲吐寒熱者瓜蒂散吐之
凡頭痛連腦痛甚手足俱寒者不治

巔痛厥陰所司而脾腎從足至頸三陰無頭疼太陰少陰

上系與督脉會於巔頂下頰頰連目出額必兼乾嘔吐沫
却無身熱亦與陽症不同三味參黃湯主之輕者小建中
湯若厥陰得乎脉則陰病見陽易愈若脉沈痛入泥九手
足冷以甲青者謂之真頭痛有上症而連齒痛者屬少陰
厥症俱不洽然風溫在少陰濕溫在太陰而反頭痛至陰
毒及太陽少陰兩感亦有頭痛不與陰症無頭疼相反邪
然少陰雖有反熱而無頭疼厥陰雖有頭疼而無身熱且
頭疼終不如陽經之甚若身熱頭疼兩全者則屬陽症

項強連背邪初臨

項硬而不能左右回顧太陽初症表實無汗葛根湯表虛有汗桂枝湯加葛根

若下邪氣乘虛入裏反結胃而項強又不解謂之結胃

項強大陷胃湯九兼理中丸或四逆湯服之所以陰毒初

病亦有項強俱以熱藥治之正陽散附子湯是也

項強連脇邪亦猛

項強連脇下痛者小柴胡湯又

有風濕項強瘧病項強見本條

頭眩有風有虛

未經汗下而眩者邪漸入裏表虛故也頭目俱眩者太陽併少陽傷風也時時目眩

口苦者少陽風邪盛也俱小柴胡湯主之頭眩善食不惡

寒者陽明風邪也茯苓桂湯已經汗下而眩者裏虛也

汗漏不止心忪身搖陽明或發熱者玄武湯虛煩頭眩心

下痞滿腹痛氣上衝咽身戰筋惕成痿者茯苓桂枝湯

湯經日下虛則厥上虛則眩所以婦人經水適來易病真

元氣散皆令頭眩間有痰火上升者輕則起方皆眩重則

轉危哉

替胃不仁不省

替乃氣不舒胃乃神不清俗謂之昏迷也經曰諸虛乘寒則為厥替胃不仁言寒氣

乘虛中人如物蒙胃其首恍惚不省人事此之眩暈更重太陽少陽病頭痛眩冒時如結胃痞硬者人參三白湯加川芎天麻吐下虛煩氣衝眩冒身振者茯苓桂木甘草湯少陰症脉沉遲面微赤身微熱下利清穀者必替胃牙出理中四逆湯并草乾姜湯選用血虛者人參養榮湯加天麻如利止頭眩時時自冒者難治太陽病下之不愈因復發汗表裏俱虛其人必冒汗自出則表和而愈又漿飲替胃厥逆者三生飲感濕重眩暈者芎朮除眩湯又有頭重二症太陽不能舉者宜發散易病不能舉者宜補真元婦入新產血虛發寒必冒見產後

身惡寒有熱無熱陰陽辨

惡寒非寒熱之寒身雖灼熱亦發近衣却不可過覆及近

火氣則寒熱相搏寒不可過經曰發熱惡寒者發于太陽也乃陽症之表惡寒無熱惡寒者發于太陰也乃陰症之裏惡寒在陽則脉浮數宜發汗在陰則脉沉細宜溫中或下症悉具但有一毫惡寒者為表邪未淨須先解表候不

惡寒乃可攻下時時審審惡之甚者屬太陽作止作惡之
微者屬少陽陽明不惡寒反惡熱惟太陽合病在表則亦
惡寒若少陰症惡寒而踈脉流細無頭
疼無項強厥冷自利煩躁脉不至者死

辨惡寒口和口燥虛實并并

風寒客於表分當一身盡寒
今但背惡寒者何也蓋背為

陽腹為陰又以背為五臟所系是以背惡寒也寒邪在裏
不能消耗津液故口中和此屬少陰宜附子湯熱邪陷內
消耗津液故口中乾燥全無滋味此屬陽明并三陽合病
俱宜白虎湯中暑及暑月傷冷陰氣乘陽亦有背惡寒者
惡風可解而漏汗溺澁當溫 惡風者或當風或用扇則怯
風吹居密室則不惡也且三

陰無惡風症悉屬陽經無汗者當發其汗有汗者當解其
肌若裏症甚而惡風未罷者尤當先解其表而後攻其裏
也桂枝湯加葛根主之汗漏不止及溺澁四肢拘急難
伸者宜桂枝附子湯凡汗不止者必惡風煩燥不得卧
先服防木牡蠣湯次服小建中湯惡風項強脇滿手足濕
而渴者小柴胡湯汗吐下後惡風大渴者白虎加參湯惡

風壯熱者參蘇飲防風冲和湯風濕相搏惡風身疼
小便不利者甘草附子湯身重惡風者防己黃芪湯

發潮

可通而氣逆脉虛忌冷

似潮水之有信一曰一發謂之潮必日晡而作者陽明旺

於未申故耳宜諸承氣湯選用或大柴胡湯有不可下者
脉浮或弦嘔噦即逆氣逆上微瀉惡寒發熱非日晡所發
是謂其熱不潮或潮於寅卯者屬少陽潮於巳午者屬太
陽為邪未入胃俱宜小柴胡和之又日晡發熱脉虛者亦
不可下宜桂枝湯微汗之若結胃潮熱脉浮者屬太陽陽
明胃湯陽明傷風腹滿身黃者麻黃連軀赤小豆湯冬陽
明潮熱黃芩湯吐下後不解如見鬼
狀棉衣摸床發喘直視脉澀者死

似瘧作止有時太陽陽明厥陰

似瘧非瘧作止有時或日三發或二三日一發非似

潮單潮而無寒亦非若寒熱往來之無定也太陽症二三
日似瘧寒多脉浮洪者桂枝湯或桂枝二麻黃一湯陽明
症似瘧汗出日晡發熱脉浮者桂枝湯脉實者承氣湯熱
入血室似瘧小柴胡主之厥陰症似瘧一日二三發脉浮

緩者為裏和自汗而愈凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節
搜攣百骸鼓振振不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱
者皆似瘧狀不必眩弦隨所見症與
脉而以小柴胡湯和解此即溫瘧也

三寒少三症弱脉脉遲同等

一症脉弱者亡陽也不可
正汗及吐下桂枝二越婢

一湯以微汗之一症脉遲者血少也先以黃芪建中湯養
血俟脉不遲乃以小柴胡湯和一症脉陰陽同等微浮
微緩不嘔清便自調此不待藥汗而自愈也若一面赤身痒
脉濇者桂麻各半湯必待微汗而後愈通用柴陳湯熱多
加川芎前胡寒多加川芎草菓若寒多熱少不煩躁而脉
浮緩者乃傷寒見傷風脉也或面色不澤兩手無脉者乃
麻黃附子細辛湯症也

往來寒熱正是半表半裏之情

經曰陰氣上入陽中則惡
寒陽氣下陷陰中則發熱

此陰陽相乘之病也若大下陰微發熱大汗陽微惡寒乃
醫之誤也大要陽不足則陰邪出于表而與陽爭則陰反

勝而爲寒陰不足則陽邪入于裏而與陰爭則陽反勝而爲熱若邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足則先寒陰不足則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多半表半裏寒熱相等乍往乍來而間作也若不嘔清便溲浮者猶當解表口渴尿赤脉實者大柴胡湯心煩喜嘔胃脇滿而不欲食者小柴胡湯熱多者加柴胡寒多者加桂枝汗下後柴胡症不除者柴胡桂姜湯寒熱往來脇滿小便不利嘔渴頭汗者最宜如寒熱勢盛當遲一二日少定方可急之所謂其盛者可待衰而已若寒熱勢定或早移於裏移於外早邪無可容之地病將解矣○夫病發言持者舊有痰痞相火之類偶然新氣加之則搏動而發此理易明言爭者乃彼此相搏相闘久而後可和解之謂不過邪正氣相引結而未遽散非實有所爭競也血氣盛者雖風寒之邪乘間而入終不能動其真氣而與之闘惟血氣弱者則邪入必闘闘則便有勝負須正氣復而後邪可退也若邪愈勝而正氣負非徒傳大扶持之必不可救此爭與搏之義也至於頭面上病皆百邪上攻胃腸間病皆百邪上衝腸胃間病皆百邪下流而傳入不然則血氣失升降

之常或陽當升而不升陰當降而不降精宜升而不升氣
宜降而不降血宜順而不順火宜靜而不靜諸病發括盡
於此矣

表裏寒熱譬如冬至夏至之景

陽氏以皮膚即骨髓之上
骨髓即皮膚之下前以錯

誤而分表裏但以冬至陽生則地中熱而外寒漸極夏至
陰生則地中冷而外熱漸極推之則誠有表熱裏寒表寒
裏熱之理且如病人身熱似火而外欲得衣微厥下利脉
沉而遲分明裏寒表熱所謂熱在皮膚寒在骨髓也活人
先以陰旦湯退寒次服小柴胡湯加桂枝表所以少陰反
熱一症裏寒表熱手足厥而下利清穀者四逆湯主之如
病人身冷似水而外不欲近衣口燥舌乾脉沉而滑分明
表寒裏熱所謂熱在骨髓寒在皮膚也活人先以陽旦湯
合白虎湯除熱次服桂枝各半湯和表所以少陰傳經熱
症惡寒而踰時時自煩不欲厚衣者大柴胡湯下之此仲

景餘議常

的從之

病發熱於表則二

蒸蒸發熱於裏則一

表熱若鳥合羽所覆有汗發

散無汗解肌二者之分裏熱若火薰蒸自內達表惟下之一法而已半表裏熱者表邪將罷裏未作實輕于絛在表絛在裏之熱也宜和解之要之不渴小便清者為表渴而小便黃者為裏或渴或不渴半表裏也然三陽經又有陰陽表裏之分蓋太陽以皮膚為表以膀胱為裏熱在皮膚頭疼頭強為表麻黃湯桂枝湯九味羌活湯熱在膀胱口渴尿赤為裏五苓散陽明以肌肉之間為表肌肉之下為近裏以胃府之內為全入裏熱在表則目痛不眠葛根解肌湯熱近於裏則口渴背寒白虎加參湯熱入裏則自汗狂譫調胃承氣湯少陽以胃脇之間為半表半裏表多小柴胡湯裏多熱甚者黃芩湯已上發熱太陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆三陽症也太陰厥陰不發熱惟少陰有反熱二症一脈沉發熱表鬱重者麻黃附子細辛湯輕者麻黃附子甘草湯一脈不出裏寒外熱者白通湯和之厥陰陽俱虛熱不止反汗下後復發熱厥躁疾下利不止者死

煩躁

以躁之煩漸而分陰陽

煩乃心中懊憹欲吐之貌躁則手掉足動起目不安心熱

則煩腎熱則躁

煩為輕躁為重先煩而後躁者為陽症分

表裏汗吐下治之不煩而便發躁者為陰症宜溫中或經

吐下而不解煩躁者亦宜溫之太繁中關脉浮大身熱而

渴者多太陽陽明病治以寒束尺寸脉沉微厥而利者多

屬少陰病治以溫熱百問云惟躁有陰陽二症太陽症煩

躁宜汗陽明症煩躁宜下若陰症發躁宜溫之是也故有

白煩躁與虛煩少異煩躁晝日不得眠夜反安靜身無大

熱陽虛也虛煩不得眠而無間斷故為裏熱宜枳椇湯吐

之冊後又云煩主氣躁主血肺主皮毛氣熱則煩腎主津

液血熱則躁故用枳子以治肺豆豉以潤腎但肺熱非心

火乘之乎凡煩躁見吐利厥逆無脉及結胃者死

古方黃連鷄子湯甘草乾姜湯芍藥甘草湯選用

煩熱

以膈之軟滿而辨虛實

心煩作渴欲嘔身熱睡卧不

無時休歇非發熱時發時止凡煩熱未經汗吐下邪熱傳

裏而作如未作膈實心中欲吐不吐鬱悶之狀者為虛但

當和緩或微汗而已經云病人煩熱汗出則解是也若心
下暴滿而煩者為實則有吐下之異賦云微煩為陽之相
勝言當分表裏而治之也又云煩極而反發厥者乃陰所
致言熱極則反與陰盛發躁一同必以四逆理中湯治之
宜與動悸
條參看

自汗不特傷風也併少陰反症而有九

曰傷風衛虛而汗
自出必兼惡風寒

也曰風溫風傷衛而溫傷氣也曰濕溫濕熱蒸而汗自出
也曰中暑熱傷氣也曰霍亂吐利而陽氣大泄於外也曰
柔瘧原因傷風也曰胃不和言臟無他病但時發熱而汗
自出乃風邪在胃宜微汗以散之曰亡陽太陽發汗過多
也曰陽明自汗不惡風寒反惡熱而熱逼汗自出也汗甚
津液內枯不可下者蜜導法惟三陰本無汗血少陰有反
有汗三症亦曰亡陽其一自汗咽痛耳枯湯其二自汗厥
冷四逆湯其三自汗嘔吐身草乾姜湯凡汗不止者先服
防本牡蠣湯次服小建中
湯如汗出如油不流者死

無汗不特傷寒也併陽明反症而有七

日太陽傷寒日太陰病日少陰病日

厥陰病日冬陽明日剛產日陰陽易皆寒絳血陰主收欬意也但陽明病當有汗今反無汗其症有三惡一寒脉浮而喘者表有邪也宜麻黃湯升麻葛根湯微汗之若無汗小便不利心中懊懣者必欲發黃宜茵陳湯小便便利吐而咳手足厥苦頭痛鼻乾者小建中湯

亡陽少血躁極痰癖不得汗須巧攻

太陽惡寒當脉浮而

遲為亡陽不能作汗其身必痒桂麻各半湯凡傷寒當汗與麻黃湯二三劑而汗不得者死熱病脉躁盛而不得汗者亢陽之極也不治陽明身熱宜有汗今反無汗身痒如虫行皮中者久虛故也黃芪建中湯本附湯寒熱厥症忽兩手或一手無脉是為重陰如登雨漚熱必濺然大汗而解其或投藥無汗而脉又不至者死雖然血虛中乾不能作汗痰飲癰癖又每隔汗而不能出血虛養血痰癖開關行氣以汗之最為活法有服藥不得汗者當用蒸汗法通

日陶氏丹
造散加減

寒入少陽冬病陽明睡中汗且盜出盜汗者邪方入裏尚連於表

裏而表不緻故汗出醒則氣過於表而汗復止膽有熱也

小柴胡湯冬陽明時浮緊者必有潮熱盜汗黃芩湯柴胡桂枝湯浮大欲眠目合則汗著小柴胡湯

陽上蒸而頭額汗表實內枯症最多諸陽上循於頭裏虛表實勝理緻密則熱

氣不得發於週身乃上蒸於頭面汗出既多則五內自枯惟裏虛忌下惟內枯忌汗屬半表裏者小柴胡湯主之

汗下後胃滿心煩嘔渴表未解者小柴胡湯去半夏加桂枝瓜蒌仁虛煩者

語者俟其過經權以小承氣湯微利之黃症水症瘀血風濕寒濕頭汗見各條凡頭汗小便不利內外關格者為陽

脫及誤下溫家頭汗而喘或小便不利大便自利者亦為陽脫二者皆不治

氣旁達而手足汗便鞭軟利法已畢

津液自胃府旁達於外則手足自汗有熱

聚胃府逼而出之者父有譴語燥糞腸明症也大便秘已鞭者大柴胡湯或大承氣湯大便不鞭而軟者小柴胡湯凡傷寒欲下而小便少手足心并腋下不滋潤者不可攻也有寒聚胃府大便初鞭後漉或水穀不分手足澀然汗出者不可下少與理中湯或猪苓湯如寒甚不食小便不利者此欲作痼瘕也宜理中兼散氣之藥治之

下後熱只陰弱而邪陷於心者則痛

大下傷血傷血陰弱

則脉蹇血虛寒極則發熱古方葶藶苦酒湯酸苦湯泄之義也凡下後不可驟補身熱心中結痛者枳實湯微汗之或醫以丸藥下之致陷熱未淨者枳子乾姜湯胃滿未消腹痛未止脉尚數實者積聚未淨也小承氣湯體薄者黃芩湯小柴胡湯益元散調之仲景云下後熱不退因汗下失宜如入日已上大發熱者難治經云陽微惡寒陰微

發熱寒多易愈

汗後熱多陽虛而邪入於裏者為實。大凡傷氣陽微發熱惡寒陰陽俱虛者。玄武湯主之。發汗後表症未退者宜再汗之。若身寒半日許而見半表裏症者宜和之。若汗後日晡如瘧狀。洗胃便閉裏症已具者。大柴胡湯下之。若但熱而嘔逆心痞自利者。大柴胡湯去大黃調之。煩煩者竹葉石膏煎湯凡汗後熱不退。脈靜者生。脈盛躁疾者此名陰陽交必死。解熱論云。汗後寒熱交作。當看脈間浮數洪大。猶當微表其汗。醫者見已經汗後不敢再表。邪氣無由發泄。誤矣。發汗後止惡寒虛也。發汗後止發熱實也。惡寒用溫藥發熱用涼藥。無不愈者。

虛者汗下之後惡寒愈增

汗後亡陽惡寒者表虛也。芍藥附子甘草湯下後惡寒者裏虛也。

也。四逆湯其有表邪未盡必兼發熱。桂枝湯又有裏實熱伏於內。陽微於外而惡寒便堅者亦必兼熱。尤宜下之。百問云。汗後惡寒人必虛。下後發熱人必實。是也。汗下後厥陰症太汗出煩躁體疼拘急。厥逆者陰陽俱虛也。

宜四逆湯以補陽加人參茯苓以益陰汗下後脈微惡寒者小柴胡湯去芍加芍藥有頭汗者柴胡加桂湯汗下後尺寸俱微陰陽表裏俱虛者小建中湯意傷寒以真氣為主陽病宜下真氣弱者下之多脫陰病宜溫真氣弱者容熱便生非藥無力主本無力也惟寡慾真氣完者易於用藥誤下氣脫皆倦不食不瀉者來復丹靈砂丹暫服之

熱者吐下之後消渴可必凡吐下後邪熱不客於上焦為

白虎加參湯心下痞者先解其表發清其裏汗後渴者少與水以和胃則愈傷寒汗吐下後邪氣乘虛而內客或壅窒而未盡皆當量虛實而調治之

咳嗽有寒熱水氣之多端咳嗽多屬肺金傷寒言太陽病者何也肺為五臟華蓋內通

肺外主皮毛而為氣之主氣逆而不下則咳風寒乘之氣冷則肺熱邪乘之氣燥則鬱水飲乘之與氣相搏寒熱水氣皆能生痰又咳之所從始也以風寒言之太陽症身熱嘔喘者麻黃杏仁飲咳喘者三拗湯少陽症寒熱脅痛或

挾濕者小柴胡去參棗加五味子乾姜少陰症厥逆腹痛
下利者四逆湯加五味子乾姜少陰多而嘔渴心煩不得
眠下利者猪苓湯春冬傷風寒夏秋傷濕冷熱寒咳鳴氣
不得下而咳者橘皮竹茹湯以熱咳言之金沸草散柴胡
半夏湯瀉白散或咳膿血者小柴胡加黃芩黑豆咳嗽身
熱臍腹滿痛者大柴胡湯下之中滿而嘔者大半夏湯解
利以後胃寒不食者理中湯六君子湯俱加五味子細辛
痰氣盛者大橘皮湯素有痰火者當於芩連二陳湯中消
息又水咳有三症青龍湯治太陽之表水有寒十棗湯治
太陽之裏水有癖女武湯治陰症之裏水有寒凡咳而小
便利者忌汗又而入臟成
勞膏之上育之下者不治

體痛有陰陽血風之然悉

風寒入肌血脉凝滯所以身痛
太陽身痛拘急而脈浮緊便

清宜分有汗無汗治之少陽身痛必脇硬嘔渴小柴胡加
湯和之汗後身痛不休脈洪者桂枝加參湯又有痛無
常處按之不可得氣脈滿者宜再汗之太陽病七八日
脈細惡寒陰陽俱虛者不可發汗吐下宜小柴胡湯誤汗

今人耳聾素熱者黃芪建中湯素無熱者芍藥附子湯
厥陰少陰身痛下利煩滿脈沈緊者先溫以四逆陽玄武
湯後發以桂枝湯血虛勞倦身痛者補中益氣湯黃芪建
中湯風邪在陽明不榮於表一身重痛者葛根湯陰毒身
痛加敗瘀血身痛發黃中濕痛難轉側風濕下身盡痛見
各條醫家誤汗身痛必發瘡葛根湯或桂枝湯以救之

渴有汗多自利水入即吐名逆症

熱在表則不渴熱入裏則熱耗津液而作渴或

汗吐下過多耗奪津液而渴然有渴必有煩者腎主水熱
深則水竭而渴肝木挾心火以生煩故厥陰六七日飲水
多而小便少者謂之消渴渴欲飲水為欲愈者傳經已盡
也脈浮而渴屬太陽有汗而渴屬陽明自利而渴屬少陰
至於厥陰則熱之極矣太陽病汗後脈洪者白虎湯無汗
而渴者小柴加水湯陽明病汗少溺澀者五苓散汗多而
渴者竹葉石膏湯少陰病下利咳嘔心煩不眠者猪苓湯
下利飲水有熱者白頭翁湯小便清自惡寒者甘草乾姜
湯厥陰消渴不食食則吐蛔者烏梅丸汗吐下津枯者白
虎加參湯陽毒消渴倍常者陷胃丸黑奴丸中署者酒蒸

黃連凡凡飲水安睡者實熱也飲水少頃即吐者火邪假渴耳凡渴不可恣飲須少與之以潤胃氣凡變水結二種水逆症渴欲飲水水入即吐者五苓散又發汗動右氣肺傷亦飲水即吐者亦宜若先嘔後渴者為欲解當少與之水先渴後嘔者為水停赤茯苓湯有風溫發黃消症見各條

因經熱裏寒水入不嘔多血疾

經熱則口燥煩而欲水裏寒則水入而不取

燕陽明症漱水不嘔身熱或微惡寒熱在經而不在裏必通血上行為血黃芩湯瘀血症漱水不嘔外無寒熱喜忘如狂犀角地黃湯少陰症脈沈厥冷煩躁或乾嘔無脈好漱水不嘔者四逆湯白通湯主之蛔厥症煩躁吐蛔好水浸舌而不欲飲者理中湯加烏梅

右一段論傷寒初症未有不自煩寒煩強身痛發

熱惡寒有汗無汗或咳嗽或出而始者故提之

於此過七日不愈者皆雜症也

悌鬱因汗失宜便堅為實藏為虛

面者陽明所主陰盛者面赤而黯陽盛者面赤

而光表症汗出未徹以致邪熱悌鬱結故頭面紅赤甚則蒸於肌膚汗出未透身痒者桂麻各半湯惡寒熱者葛根湯汗太過發黃者茵陳湯驚悸者火邪湯大便艱者重已實也大柴胡湯下後嘔者胃虛也桂枝參苓湯

戴陽浮火所衝陰症

下利熱微陽熱甚

遲者陰症也身微熱者裏寒也面戴陽者面雖赤而不紅活乃下虛也醫者不察脈以虛陽上二因熱誤為實熱下之又用涼藥則氣滯而成大病矣仲景理中四逆陶氏參元湯主之若陽症面赤脈洪大腹滿潮熱大便不通者大

柴承氣主之

目盲鼻鳴而嘔衄者熱搏之重

難經曰脫陰目盲言精血脫而不上榮於目故目盲

不了或無所見也傷寒發煩目盲甚者必衄蓋肝血為熱氣所搏妄行於上而為衄得衄則熱隨血散而解與麻黃湯或麻黃升麻湯九味羌活湯蓋傷寒衄為積熱在表用麻黃羌活者非治衄也以解太陽經之邪耳此與太陽病其人適失血及下利宜桂枝湯法同但衄家最忌發汗邪輕者犀角地黃湯又目近鼻為內眚屬太陽近眉尾屬少陽當面屬陽明赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病熱則目赤風則目眩寒則目疼又爪惡目不能開陰症眼睛痛陰陽易病眼中生花○鼻者呼吸清氣之路上竅於肺下通膀胱風寒壅則鼻鳴而必乾嘔太陽病桂枝湯太陽陽明合病鼻乾肌熱者葛根湯

又手冒心而聾耳者陽脫之內

難經曰脫陽者見鬼無陽氣而見鬼陰之鬼傷寒汗

過亡陽其人必又手自冒心而聾耳者何也蓋耳屬腎陽氣盛則上通而聰陽氣虛則下脫而聾仲景云少陰受病則脇滿而耳聾者是也宜芍藥附子湯黃芪建中湯救之心悸欲得按者桂枝甘草湯撮空神昏者陶氏升陽散

火湯若初症手少陽風病厥而聾者耳中燔燂燂燂小柴
胡湯最忌吐下以致驚狂手太陽熱厥聾者耳中塞滿加
之熱壅出血出膿則成傳耳濕溫厥聾耳聾見前又有風
邪入腎耳中卒痛外症寒熱不急治則發強如瘰俗名黃
耳傷寒不可作正傷寒治之內服小續命湯敗毒散外用
虎耳草搗汁滴入耳中上症頭汗如珠不流者陽脫即死
四肢胃未由熱而溫而令逆知是傳經之厥傷寒邪在三
半表半裏及太陰則邪漸入內則四肢溫傳至少陰厥陰
則邪入深而陷伏於內則四肢厥冷然先由熱而後厥者
傳經熱厥也輕則四逆散白虎湯竹葉石膏湯重則大柴
承氣下之若邪乍結胃中心煩不食而厥者瓜蒂散吐之
百問云熱厥與冷厥不同熱厥者微厥却發熱若冷厥則
不發熱四肢逆冷脈沈細大小便滑泄惡寒指甲青色又
有失下血不通四肢便厥醫者不識疑是陰厥後進四逆
湯之類猶如及掌大抵熱厥脈沈伏而滑頭上有汗手掌
溫指梢亦溫便宜下
此仲景之妙旨也

一舌心苗由白而黃而燥黑失其本體之紅主津液無病

則舌紅而潤偶見紅星點者將欲發黃如丹由邪熱則心苗枯稿生胎如白胎然是以邪在表則無胎邪初傳裏則胎白而滑胃寒客熱懷懷者施鼓湯吐之陽明症脇硬不大便而嘔舌胎白者亦不可攻小柴胡和之如惡寒欲嘔痰者小柴胡加乾姜白胎滑而下利者為臟結不治○熱漸入哭則胎白而溢熱深入胃則胎黃或肥光或尖白根黃者表多裏少也俱白虎加參湯主之○手足腋下汗出譫語便閉胎紫帶黑或生芒刺重碎燥烈者承氣湯下之但舌黑亦有數種有四邊紅而中灰黑者路者失下也有黑圈者過經未解也有黑尖者虛煩也有舌見黃而中有黑至尖或黑亂點者熱毒深也有弦紅心黑或白胎中見黑點者表未解也有根黑尖黃胎滑者可下胎滑者可汗有尖黑而有亂紋脈滑實者急下之脈數無力者必發渴而死凡舌黑不論多少俱係危症惟冷而滑如淡黑然者乃無根虛火可以化痰降火藥治之○陰症胎白腹痛自利者理中湯中濕濕痺舌上如胎非真胎也丹田有熱胃

中有寒

五苓散

無寒熱而唇焦者多因血瘀不發寒熱胃滿唇焦漱水不

便利大便黑者

血瘀於下也

無色澤而唇青者必是寒中陰症胃滿面色及唇皆無色澤手足冷者理中湯若唇

青有少瘡則

為狐惑

口乾口燥口涎豈無異口乾者邪熱聚胃消耗津液故也

相有陽明口乾熱甚口噤背微惡寒者白虎加參湯少陽

症口乾者小柴胡湯瘀血症口乾漱水不欲飲者承氣湯

氣湯口燥亦因脾胃有熱津液涸少陽明口燥咽乾背

惡寒煩渴者白虎加參湯少陽口苦咽乾小柴胡湯雙解

散少陰口燥舌乾者承氣湯口燥咽乾默默不欲言者宜

以狐惑治之凡口乾燥忌汗汗之重亡津液口涎有陽

所素盛者則延熱
少陰寒症則延冷

氣逆大相同

氣逆者氣自腹中時時上衝也太陽下

之早去邪氣逆上衝邪仍在表當復汗之厥陰客熱氣上衝
受邪氣逆上衝邪仍在表當復汗之厥陰客熱氣上衝
心北熱主裏而氣上也下之胃滿實者吐之汗不後氣逆
較中者表裏在木甘草湯有痰後重氣逆吐氣逆者
有動氣發汗氣逆者○氣喘者有太陽陽明二症太陽症
無汗而喘宜汗陽明在汗多而喘宜下太陽陽明合病胃
滿而喘惡寒者不可下汗而喘下也○微喘緣表之
未解喘滿不惡寒者宜下而喘又有汗後停水喘者有汗
下後喘者有表氣喘者喘急者速陰脈伏者加味生脈
散如脈伏汗出惡寒者脈絕不流○氣短者呼吸不相接
續如喘而不搖身似呻吟而無痛也經曰微重相轉則為
短氣短氣不足以息者實少氣不足以息者危有結實者
言行水怔忡者有風濕相搏者有素弱及下後脈微氣虛
言大抵心腹脹滿者為實為邪在裏心腹濡滿者為虛

為利在表氣

喘不逆亦然

濕嘔乾嘔宜察腎肝病症

濕嘔有物有聲食已則嘔乾嘔

故嘔吐為重也熱嘔口苦煩渴脉數手心身熱寒嘔頭

痛胃滿厥冷吐沫脉遲吐噦胸飽背然○濕嘔表邪傳裏

重氣上逆故半表裏症多嘔也三陽發熱者俱小柴胡加

生薑主之胃滿日嘔潮甚加芒硝嘔不止便閉者大柴胡

湯主之多雖有陽明症胃滿不可下者甘桔湯煩渴者先嘔

後瀉為發愈猶若湯先瀉後嘔為停水赤茯苓湯飲水即

嘔者五苓散虛煩渴者竹葉石膏湯加姜汁或梔豉湯上

熱下寒者黃連湯胃寒下利厥冷不渴者理中湯去朮

加薑汁或正氣湯加姜汁少陰三症膈上寒飲嘔吐涎沫

或吐沫而渴者四逆湯加生薑脉沉或咳或悸按水氣者

玄白湯去附子加姜汁手足寒心中溫溫欲吐不吐慣慣

無奈何者生薑汁半夏湯經汗下厥者乾姜黃連人參湯

汗後水藥及穀食不下者危小半夏湯救之又有溫毒嘔

者心悶發斑水症嘔者先嘔任仲嘔膿血者腥膿氣逆上

新嘔蓋自愈。○嘔胃熱與穀氣相併上薰心下痞塞故
嘔則無所出食則不能納黃連解毒湯有大陽無汗乾嘔
者風邪上壅也桂枝湯有大陽陽明合病不下利而但嘔
或乾嘔者裏實氣逆上而不下也葛根湯胃寒津枯乾嘔
渴者理中湯少陰三症乾嘔下利脉微者白通湯裏寒外
熱脉微欲絕者通脉四逆湯利不止煩躁厥逆無脉者白
通加猪膽汁湯厥陰頭痛乾嘔吐痰或自利嘔冷煩躁者
三味參夏湯胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憤憤無
奈何者生姜汁半
夏湯大小橘皮湯

吐酸總因胃府熱寒

吐有物無聲食入即吐并溪以
傷太陽血病然胃實主之吐利

腥腥者為寒酸臭者為熱治與嘔噦一同凡嘔吐即軟痛
者脚氣也嘔吐脉弱小便自利身微熱而厥者虛極難治

噦皆因水寒相搏

噦即乾嘔聲更重且長耳聞乃胃間
氣塞不通胃脉浮則為噦滑則為噦

皆因胃氣本虛汗下太過或復飲冷水寒相搏胃虛氣逆
而上理中湯加肉桂丁香以散寒下氣茯苓半夏以瀉水

噦不正者橘皮乾姜湯橘皮竹茹湯間有熱邪壅鬱上下
之氣不得通者俱小柴胡加生薑和之熱甚便難者小
氣下之便軟者諸瀉心湯選用溫病發渴飲冷作噦者
府胃根湯加茅根凡嘔噦必用半夏散結氣也用竹茹
胃鮮煩也用生薑散逆氣也嘔噦餒皆因
氣逆故姜為嘔家聖藥熟者烏梅代之

餒逆

亦有陰陽兩端

舊以為欬嗽之欬俗又以為口吃之
吃虞花溪考讀書餒與餒通乃氣逆

上之名又有以餒逆為噦者噦出聲然後吸餒逆入聲逆
盡然後呼出入呼吸不同兼嘔噦者本於胃餒逆本於肺
穀入於胃胃氣上注於肺故寒氣與新穀氣相忤逆而復
於胃故噦噦有聲所以丹溪力辨乃相火自贖下直上衝
胃交於厥陰水火相搏而作聲也○陽症發熱口渴胃滿
脈弦數小柴胡湯加竹茹小便閉加茯苓或猪苓湯大便
閉者調胃承氣湯少陰症失下腹滿便閉或純下清水餒
逆者小承氣湯陽明身熱口渴胃滿煩躁脈洪數餒逆者
火衝肺也甘草瀉心湯○陰症便軟胃寒或因吐下虛極
惡寒脈細者橘皮乾姜湯內寒厥冷者活附子湯一查

柿蒂散調蘇合香丸胃寒飲水相搏者小青龍湯去麻黃
加附子手足厥冷者小橘皮湯胃痛虛煩者大橘皮湯凡
飽逆藥中俱宜陳皮竹茹姜汁此症有欲作正汗陰陽升
降而然者即愈又有食積而致者小便閉澀及痰火上衝
者腹滿不得小便及脈見沉微散者死已
上嘔噦飽逆大同水氣表裏俱有此五症

衄血

熱迫於鼻動經則為衄竭不治

經絡中熱盛逼血從

陽名曰陽血熱滿不成流者表猶未解當用辛涼之藥解
表九味羌活湯加赤芍或升麻葛根湯加黃芩或麻黃升
麻湯麻黃散渴者五苓散煩者竹葉石膏湯以散經中之
熱仲景云傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之是
也如無表証衄血成流及因汗而得衄或下又見血者不
治自愈不止者犀角地黄湯陶氏生地赤芍連湯黃芩湯茅
花湯外用冷水浸紙貼太陽穴紙熱又換或用百草霜脂
髮燒灰吹入鼻中九竅出血亦効凡衄不宜即止恐餘血
入胃著於上焦為血結胸症○直中少陰症熱行於裏先
熱後厥無汗亦陰症似陽也醫不能識雖發其汗必動其

經外則筋惕肉瞤內則伏熱逼血從耳目而出或從口鼻
而出名曰陰血是為下厥上竭不治但礪為下厥血出於
上為上竭輕者黃芩湯加生地之類或當歸四
逆湯黑錫丹救之動經與鼻衄微有不同如此

吐血熱積於中併牙乃是腎胃相殘汗乃心液熱則變紅而逆出上竅陽邪不

汗必致熱毒入臟化為痰血從口吐出多屬陽明凡見目紅骨熱神昏狂譫胃腹急滿皆血注也熱淺者犀角用地黃

湯加黃芩山梔茅根藕節或小柴胡湯黃連柏皮湯熱深者赤白承氣湯三黃湯抵當湯九陽毒者升麻湯作湯若

五苓散恐水入復吐故也或竹葉石膏湯皆加川芎調血炒山梔降火危哉又有陰症吐血脈遲腹痛厥逆嘔吐紫

黑色者難治姑以理中湯并桔湯加生薑汁半夏湯救之又牙床屬胃牙齒屬腎如陽明傳入少陰二經相併血出

於牙縫如吐者人多不覺其為牙血以凉水漱血則止少頃又來者是外用綠袍散內服解毒湯合犀角地黃湯或

生地黃連湯下之輕者清胃降火而已

漏汗驚狂癰痺總是火邪逆

火邪者或不當汗而用火取汗或汗不得而用火劫奪以

致火氣薰蒸精神昏瞶肢體不寧體虛者漏汗不止真陽

脫亡凡汗不得者謂之亡陽汗多不止者亦謂之亡陽如

心痞煩煩面青膚潤者難治色黃手足溫者可治因太陽

症者桂枝湯加附子或汗下後見吐逆者亦宜因少陰症

者四逆湯或便清乾嘔者甘草乾姜湯咽痛者猪膚甘草

湯如少陰既逆謔語被火小便難者必滋其津液竹葉石

羔湯去半夏加生地或時儼然而起惕然而驚起卧不安

若狂者救逆湯煩燥遺精者桂甘龍骨牡蠣湯體實者雖

不至亡陽然內火外火相併熱發於外則身必發癰熱轉

於內則小便必難驚狂謔語煩躁不已或一身盡痛甚則

手掉足動搖衣摸床者死如小便利者可治通用柴胡龍

骨牡蠣湯火邪湯或下清血或下膿唾血者犀角地黃湯

發黃痺者茵陳湯若太陽症汗而反用火灸者

其邪無從而出病當腰下重痺麻杏薤甘湯散之

謔語者全憑水道看

謔語者疾也或閉目言平生常事或開目言人所未見事或

獨語或睡中呢喃或呻吟不已其則狂言罵詈俱謂之譫
語皆因用熱乘心故脈來洪數二便多閉外見陽症有陽
明汗多譫語少陰自利譫語者內有燥屎也調胃承氣湯
下之半未裏熱不欲語及已得汗而身和亡陽譫語者
柴胡桂枝湯調之已下胃煩身重不可轉側譫語者柴胡
龍骨牡蠣湯調之已下胃煩身重不可轉側譫語者柴胡
湯和之已下胃煩身重不可轉側譫語者柴胡湯和之
者邪留心胞也知母麻黃湯如氣逆下利厥冷而脈又沈
細者死身熱脈大聲清氣胡目光面潤者生瘀血亡陽合
病濕熱入血室火邪譫語見各條○鄭者重也言語重
復不已聲音摸糊有如鄭衛不正之音皆因汗下後及風
溫發汗過多以致表虛裏竭精氣奪而神昏舌短故脉息
沈微二便多利外見陰症白通湯救之或單人參湯亦可
故曰譫語實則可下虛不可為實者胃實有燥屎也虛者
胃虛腸自利也
全憑水道斷之

咽痛有熱無熱腎伏暴寒下必利太陰絡咽少陰絡喉熱
邪乘之乃生咽痛若汗

下過多虛而生熱亦能咽痛有少陰身熱腹痛脈沈咽痛或不食嘔吐者黃連龍骨湯少陰客熱咽痛者甘草湯寒熱相搏及亡陽咽痛者猪膚湯甘草桔湯二便難者甘草湯加玄參枳殼順道黑臭之物續以甘草生薑煎湯頻與之以解其毒或陶氏芩連消毒飲陽毒發斑吐血咽痛者玄參升麻湯陽厥宜下反發汗則口瘡赤爛內服升麻六物湯外用蜜清黃柏汁含之咽喉閉塞者烏菟湯聲音不出者鵲舌苦酒湯有少陰咽痛無熱下利四肢厥冷者甘草桔湯散冷吐利脈沈者猪膚湯厥冷下利不止者四順湯九或通脈四逆湯加桔梗不可汗下有汗者藁本末撲之又有腎傷寒一症乃非時暴寒伏於腎經初起頭痛腰痛咽痛次即下利脈微弱者先用半桂湯次用四逆湯主之傷寒六七日大下後脈遲不至咽痛吐膿血厥冷利不止者死麻黃升麻湯救之

臟結有痞無痞臍痛引陰生必難

臟結與結胸相似皆下

結在胃者為結胸與陰相結結在臟者為臟結惟其陰結故臟結無陽症不往來寒熱或但寒而不熱其人反靜飲

食如常時時下利舌上白胎脇肋臍腹引入陰筋俱痛者
丹由有熱胃中有寒所以難治又病人脇下素有痞氣再
加傷寒邪氣與宿積相合使真臟之氣閉結而不通亦名
藏結不問有痞無痞慎不可下邪未全成熟猶在表止宜
小柴胡加生薑以和表灸關元
穴以回陽而解陰氣之結危哉

結胸下早而緊痛大小寒熱宜細辨而表邪乘虛客於上

焦少陽之分名曰結胸當心緊痛而煩水漿不入但能仰
而不能俛其表邪又不熱故項強如柔痙狀有大結胸者
不按而痛胃連臍腹痛硬手不可近不大便日晡熱潮太
陷胃湯丸有小結胸者按之方痛只心下硬小陷胃湯有
寒實結胸者身不熱口不渴但心中脹硬而痛枳實理中
丸五積散甚若三物白散有熱實結胸者心下滿硬懊懣
煩躁而渴柴陷湯甚若大陷胃湯有水結胃血結胃陰毒
陽毒結胸見各條結胸脉浮大者不可下下之即死結胸
症具而煩躁者死結胸見陰脉陰症及喘急飢逆者亦多
死若未經下而胃滿者乃半表裏吐症不可誤作結胸

痞氣下早而虛滿硬滿噓利更易安

傷寒半表症下早而邪入於中焦太陰之

分而成痞氣按之濡而不痛此之結胃更輕有胃滿而硬嘔吐下利者裏實有水也大柴胡湯心痞引脇下痛乾嘔者十棗湯汗出惡寒者附子瀉心湯有胃滿而濡脇肋脹滿者虛邪氣聚耳小柴胡湯加乾姜牡蠣各一錢胃虛氣逆者半夏瀉心湯有心痞噓噫者胃不和也汗出脇有水聲雷鳴者生姜瀉心湯心痞噓噫不止者旋覆代赭石湯有下利者裏虛也穀不化腹鳴者甘草瀉心湯或已數下表邪入裏干於腸胃遂成下利而心下痞硬者謂之表裏不解桂枝人參湯下利不止者赤石脂禹餘糧湯又結胃痞氣關脈皆沈如關浮惡熱心痞者乃肝熱非痞也三黃瀉心湯心痞而口渴瀉心湯瀉心湯不効者乃停水非熱痞也五苓散凡痞氣服諸瀉心湯而熱不除者亦須大陷胃湯九下之但結初與痞雖宜下然浮惡寒有表者須柴胡桂枝湯或柴陷湯瀉心湯表必去表症去能開尺沈滑緊實者方可下之下後病猶不退者乃下虛氣逆上攻枳實理中丸和其胃氣初起未成痞結之際虛者亦宜枳實理中

九寶者枳梗湯橫切湯陳氣然後隨症用藥胃冷厥逆者俱宜理中四逆和胃待日久邪不退而後議下是結胸痞氣始未用藥俱同但中間用藥更有輕重之殊耳不識前輩分陰陽二症謂何陶氏又以傷風為陽傷寒為陰王氏又以痞氣為陰症有表者皆於理未暢要之皆傳經陽症但下後胃寒而用藥有宜溫者若邪盛胃實方可寒涼下之二症皆然且若傷寒論正文云太陽少陽併病而反下之成結胸心下痞硬入裏則為痞氣初未嘗分陰陽也設有陰症誤下不死而結胸痞氣者亦當以陰毒結胸法治安我及用三黃瀉心等劑耶以此論之謂陰陽二症俱有結胸痞氣則可謂陽症為結胸陰症為痞氣則不可又用寒涼藥治陰症尤不可知者裁之○又心下妨悶不帶不硬者謂之支結表未解者柴胡桂枝湯胃熱滿而微結者小柴胡加乾姜牡蠣各一錢表裏俱不解者桂枝人參湯客熱懊憹時發躁懊憹心中不自如也此躁更甚表症誤下陽氣內陷心下固硬者則為結胸痞氣空虛客熱在膈短氣煩躁微疼則為懊憹將成結胸宜大小陷胃湯但懊憹煩不得眠餓不能食頭汗出而不

結胸者，下後懊憹，腹脹坐卧不安者，枳實芍藥湯。下後懊憹者，內有燥糞，猶宜承氣湯下之。懊憹，小便難者必發黃，茵陳湯。

內虛動悸，必生煩。如入將捕，即悸，意也。有水停心下，頭眩身搖，厥而悸者，參其水而悸，厥自定。有神氣素虛，心中空耗，不能自持者，有汗下後內虛而悸者，比之素虛者尤甚，須先定其氣而後治其悸。大約先煩後悸者，為裏小建中湯；玄武湯，時代者，炙甘草湯入酒少許，汗後口乾者，桂枝甘草湯；先悸後煩者，為熱，小柴胡湯；喜嘔譫語，太便秘者，小柴胡湯加大黃，或加芒硝少許。譫語，小便不利者，柴胡龍骨牡蠣湯小。

便赤者，五苓散。

胃滿多帶下，表肌症。胃滿者，未經下而胸膈氣塞，滿悶，非心下痞氣，亦非結胸也。蓋外邪自皮毛傳入，胸中少陽所屬，半表裏症也。柴梗湯主之。譫語身痛者，柴胡龍骨牡蠣湯有痰氣逆上，搶心者，桅枝湯或加甘草。

入胸中，少陽所屬，半表裏症也。柴梗湯主之。譫語身痛者，柴胡龍骨牡蠣湯有痰氣逆上，搶心者，桅枝湯或加甘草。

生薑譏下脉促者桂枝湯去芍藥喘急者杏耳石湯胃虛者半夏瀉心湯噎硬便閉屎膿者方可譏下尋常胃腸不利多挾痰氣食積者柴陳湯枳椳湯調之

脇滿半居表裏間 脇滿非腹中滿也乃脇肋下脹滿半表半裏之間多耳蠶乾嘔寒熱往來默默

不欲食少陽所主小柴胡湯和之如太陽未罷項強者小柴胡加乾葛湯明便閉舌胎者柴梗湯挾痰熱者柴梗半

夏湯有冰症及臟結脇滿者見各條

腹脹裏有邪陽閉而陰利厥腹脹裏未淨吐下實而汗

後重 傷寒外邪自表分皮膚肌肉而入於胃腸脇肋為半表裏直至傳入胃府乃為入裏是腹脹歸屬太陰而

裏症尚淺未全入府猶宜和之惟腹滿硬不減咽乾口燥便閉者乃陽邪入裏方可下之若腹滿時減吐利厥冷

者乃裏寒陰症速宜溫之○又汗後滿者外已解而裏亦不實乃脾胃津液不足氣虛不通壅而為滿宜厚朴半夏

甘參湯以溫散之吐下後前若表邪未淨惡入裏以致
上下氣不通和宜大柴胡湯加厚朴薑半夏之或枳子厚朴
湯量吐之合病脹者身重痛口頑麻白虎湯加減通用柴
梗湯柴梗半夏湯凡脹滿忌用白朮閉氣如腹脹喘而不
尿脉瀼者死

腹熱閉冷利皆邪入裏相搏寒熱邪氣入裏與正氣相
搏則腹痛陽症不可按按

大便閉者為熱表症設下表裏俱病者桂枝加芍藥湯其
者加大黃半支裏症者小柴胡湯去參加白芍表裏俱熱
者大柴胡湯或腹脹痛實者不可下而便閉者內有燥
屎也大承氣湯經日痛隨利是也熱厥泄瀉者四逆散
上熱下寒欲吐者黃連湯厚煩者枳殼湯加厚朴枳實○
陰症可投與探痛無休息腸鳴而太便利者為冷太陰理
中湯黃芪建中湯少陰四逆湯玄武湯厥陰正陽散當歸
四逆湯太陰連水腹痛甚自利不止者難治又大腹屬太
陰臍腹屬少陰臍下屬厥
陰多有誤食積與痰火者

肝病 熱發冷結有物非氣為辜心胃與大腹滿者皆外邪傳入惟小腹脹滿者非也

廣便是病結膀胱者小便便自利熱結膀胱者小便便自澀又有冷結膀胱小便亦澀但手足厥而胃不滿為異宜

外灸關元穴
內服中氣武湯

妄施三法 **動積** **氣奔豚** **上衝尤甚** 其人先有五積在膈中或勝上下左右復因傷

寒邪氣動新邪與舊積相搏而痛或醫人不識誤病者原有痞積去之汗吐下發動其積氣繁繁然跳動名曰動氣動者肺氣則咽乾鼻燥飲渴飲即吐水動左所氣則筋惕肉瞤身熱盜汗動上心氣則掌熱作渴氣上衝心動下腎氣則心煩骨痛食則嘔吐或下利清穀大瘰虛者通用理中湯去白朮加肉桂頭眩喘汗多者防不吐瀉湯小建中湯腹滿身微熱欲飲者甘草乾薑湯心煩骨痛吐食者大橘皮湯熱者通用柴胡桂枝湯煩渴者竹葉石膏湯心煩渴者五苓散心痞下利清穀者甘草瀉心湯氣上衝心者李根湯五積惟膈下奔豚衝心最甚多因汗下心虛

而腎氣乘虛上衝有若江豚奔浪然桂枝湯加桂一倍
正上衝者不可妄與下動甚頭眩身振者茯苓桂枝大
棗湯吐後去棗加白朮蓋白朮閉氣止可
慙用惟桂枝湯奔豚苓伐腎邪奔豚妙藥也

邪犯三焦成霍亂吐利不發則殂

三焦水穀道路邪在上

利而不吐邪在中焦上吐下利病因飲食不節清濁相干
陰陽乖隔輕者止曰吐利重者痺煩擾亂乃曰霍亂外症
必發熱惡寒頭疼身痛本傷寒也因邪入脾胃故發為
吐利然中焦為寒熱之半邪偏高居陽分者則多熱而瀉
五苓散分利之邪偏下居陰分者則多寒不渴理中湯分
利之風寒濕勝者霍香正氣散除濕湯五積散穿山甲勝
大渴者二香黃連散益元散柴苓湯選用傷食甚者平胃
散治中湯主之轉筋者氣不和也俱加水瓜或單用雞屎
白罌炒為末溫湯化下方止凡霍亂多責於熱故夏秋為
盛或熱伏於內手足如冰六脈沈伏食即節逆此火氣上
奔而然不可誤為陰症必吐利小便亦自利而大汗出下
利清穀寒熱四肢拘急腹逆脈微欲絕乃為陰症四逆湯

或加吳萸生薑救之少陰吐利煩躁欲死者二味參萸湯
吐利止自汗厥逆不渴脉微欲絕者通脉四逆湯加猪膽
汁吐利止身痛不休者桂枝加參湯吐利止發熱者隨症
微汗之吐利止亡津而渴者竹葉石膏湯白虎加參湯吐
利不止者薑砂枳木香乾姜煎湯下凡霍亂不可逆與米
飲粥飯等食以助邪氣必所傷物盡然後發食少少養之
傷寒心痞發熱吐利者大柴胡症也不可誤為霍亂○乾
霍亂者氣痞於中欲吐不得吐欲泄不得泄所傷之物壅
閉正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急以薑湯下盡入重
便姜汁頓服探吐令透未吐再服外用鹽炒吳萸熨臍下
即以理中湯加陳皮調之或藿香正氣散加官桂倍枳壳
茯苓木瓜吞蘇合香丸如發熱頭腹痛者桂枝加大黃湯

大便閉本裏熱而帶表屬陰未可攻下

論云陽結能食下
大使者即裏熱症

言陽氣因結於腸胃蓋病邪在表則大便如常邪傳入腸
胃之裏謂之正陽明病潮汗閉澀滿渴狂譫尺脉實者諸
承氣湯選用如脉浮帶嘔舌上白胎者知邪未全入府猶
屬半裏所謂嘔家雖有陽明症不可攻舌上白胎未可攻

者是也宜與小柴胡湯和其榮衛通其津液得微汗而自
解然有數日不大便而妨悶甚若結尚有表症亦當與
大柴胡湯或發汗利小便多而大便硬者皆津液內竭宜蜜
導之大使硬小便數者乃為脾約宜麻子仁丸大使堅小
便少者未可攻津液未充候其小便自如乃可攻也當問
病人下利小便幾行若如常當知氣已下行大便不久自
出要知古人審用轉運者欲行大承氣湯當先一日用小
承氣湯候其腹中轉失氣轉氣者腹中響而放屁知其有
燥糞真若有宿食宜攻之若不轉失氣者必先硬後泄勿
攻之金匱云六七日無所苦不可攻下之早熱氣乘虛入
胃重者必死又便閉屢下不通者須臾以提之○陰結脈
沈遲不渴不食身重如石且冷大使硬而難非燥糞也
乃陰寒固結於胃血氣凝滯而閉塞也宜四物湯附子湯
或金液丹古半碗在九積散如久不大便而脉反微瀼者
裏虛甚也急以黃芪建中湯救之又有食滯脾及血燥而
不大便者當於雜病
傷食及燥門求之

小便閉本下熱而亡津屬陰難

以參疏

傷寒邪在表則小便便利入裏下焦直

熱引飲過多小腹脹硬小便閉者脉浮五苓散脉沉猪苓湯大便乍難乍易而小便不利者內有燥屎大承氣湯若

陽明汗多或發汗胃中津乾不利者如忌疏後待其津液還而自通可也汗下後發熱煩躁頭項心痛無汗小便不利者

利者三白姜棗湯半表症小柴胡湯去柴加茯苓諸語身重者柴胡龍骨牡蠣湯少陰脉沈小便不利者玄白湯主

四逆湯加茯苓少陰腹滿痛便膿血小便不利者赤白散又陰盡下利小便不利囊縮小腹痛欲死者急與四逆散

煖藥服之若用寒涼之藥陰氣伏蓄小腹有至死者或見小便不利以性益熨臍下陰氣不散彼熱物熨之令氣衝

心亦有致死若凡小便閉而嚴逆頭汗出者陽脫關格不治水菴黃症風濕小便不利見前

水難陰虛而陽邪湊襲

小便難者出不快也經曰陽入陰分則膀胱熱而小便難惟陰分

而陽熱乘之不可強利必小便黃赤者乃可萬全不通湯利之如太陽汗不止者桂枝湯加附子陽明傷風當計身

黃耆小柴胡湯加茯苓

水利偏前而後便乾枯

傷寒內熱則小便閉今反利者膀胱主津液而偏滲於前宜乎後便

乾枯有瘀血症小腹硬滿其人如狂者抵當湯有少陰症

厥逆脉沈者四逆湯或文或武湯去茯苓有陽明症自汗小

便利而大便雖硬者不可攻宜蜜煎法或

猪膽汁灌之有停水心悸者茯苓桂枝湯

膀胱移熱小便澀濁而不痛裏和則小便清裏熱則小便

與赤濁相似道赤散或文胡索散朴硝二味等分水煎服或加川芎滲利之劑尤妙此亦瘀血中之一症也

腎虛協熱小便澀數而無餘惟虛則小便頻數惟熱則小便澀數

陽自汗小便數者雖有表症不可挂枝重亡津液誤服

者陽不足也其草乾姜湯心煩脚腫者血不足也芍藥其

草湯有宜下者諱語自汗小便數者調胃承氣湯少與之

汗吐下後小便數大便硬者大柴胡湯陽明汗多小便數

大便硬者胃強脾約乃約東津液不行宜脾約丸餘瀝遺溺見後危症

協熱自利而渴曰腸垢腸間津分垢膩熱甚純下清泉

協寒自利不渴曰鴨瀉清白如鴨屎狀濕毒有如豆汁陽症自利瀉泄身熱

臍下亦熱作渴尿赤後重泄下黃赤故曰腸垢陰症自利太陰手足溫少陰厥陰手足厥冷瀉下亦冷不渴利下清

白故曰鴨瀉熱因表邪裏挾風則所下必暴寒乃直中陰經大法熱宜和緩或攻泄或利小便便寒宜溫中或固下

焦俱不宜發汗令胃氣虛而脹滿作但自利舊分陽症陰症又分協熱協寒而治法相同然陽症自利亦必裏氣虛

而表熱乘之乃能自利雖太陽初症下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至於陰即協寒其症尤顯所以云陽症

下利設溫則發黃寒出而死此等支離去處每為合下底不惑人太驟裏氣協熱下利黃赤者黃芩湯最妙帶表口

渴下利者柴芩湯少陰熱症渴而下利者白虎湯少陰熱症咳而嘔渴心煩不得眠而下利者猪苓湯熱甚口燥心

痛下利純清水者大承氣湯潮熱譫語脈滑有宿食者大
柴胡湯或陶氏黃龍湯下利脈和者內實下利脈滑或浮
大按之反澁不欲食者有宿食並宜下之又太陽初傷風
下利不惡寒頭痛乾嘔心痞腹痛者桂枝湯加芫花或十
棗湯胃不利腸鳴下利者生姜瀉心湯小便澁大便利者
赤石脂丸下利頻而溺如常者自止橘皮竹茹湯調之合
病自利及心痞下利見各條○裏氣協寒下利清白太陰
不渴者理中湯四逆湯寒毒入胃者四逆湯加韭白少陰
自利虛渴脈微者白通湯厥逆無脈者白通加猪膽汁湯
通脈四逆湯少陰下利咽痛者甘桔湯厥陰下利先厥而
後發熱者下利必自止若再厥者必復利也小建中湯當
歸四逆湯利不止者赤石脂禹餘糧湯又下利身痛者先
以四逆湯救裏利止但身痛者急服桂枝湯救表凡下利
譫語直視及厥燥不得眠汗不止無脈及自利不禁身熱
脈實者皆死○濕毒下利膿血腹滿腸內刮痛如魚腦爛
或如黑豆汁者除濕湯猪苓湯地榆散濕熱者敗毒
散黃芩湯白頭翁湯如無濕但熱毒日晡壯熱腹痛便下
膿血稠粘者黃連阿膠湯濕熱風者胃風湯加木香濕熱

寒者不換金正氣散加乾姜木香又陽症便膿血者亦名
協熱腸垢當清其腸犀角地黃湯陽明熱入血室下血者
小柴胡湯加生地枳壳山桅少陰下利膿血者
亦謂之協寒鴨瀉當因下焦桃花散赤石脂丸

壯而熱止其利斷下之生也不長
少壯人實熱下利不宜止
止瀉止之則加熱悶而

死名曰壯熱斷下

厥而利反能食除中之死也可立
邪在表則能食邪在裏則不能食
表裏之間者

欲食而不能食今傷寒厥深下利脉遲當不能食
而反能食者名曰除中中之胃氣既除豈可再復

風漏手足攣攣陽虧四肢拘急
四肢諸陽之本腰背太陽之絡因發汗腠理空疎蓋

覆不週將息未久以致風邪復入筋骨之間攣攣有妨行
持牛旁根湯主之如脚攣齒者風熱也承氣湯下之
拘急者手足不能自如屈伸不便踞卧惡風之貌發汗亡
陽而有此症汗多小便難者桂枝湯加附子吐下後發逆

拘急者四逆湯心煩足攣屬血虛者芍藥甘草湯
陰陽易病亦有手足搐攣如風狀者古瓜竹湯

太陽腰痛項連尻陽明不可顧少陽如針刺汗無汗傷寒

人參順氣散傷風敗毒散或通氣防風湯粗人刺委中血
甚妙太陽合陽明葛根湯少陽柴胡桂枝湯與頭痛參看

少陰腰痛背及脊太陰遺溺其則遺溺厥陰張弓厥陰
故腰強急如弓三陰通用五續散加杜仲附子或加於

黃芪建中湯當歸四逆湯中尚當於雜病腰痛參看

陽氣虛而筋惕肉瞤陽氣者精則養神柔則養筋汗下後
津液耗竭陽氣大虛肉筋失養故惕

然而跳瞤然而動久則成痿治宜溫經養榮益胃玄武湯
是也羸甚去芍藥熱者去附子或陶氏溫經益元湯亦好

汗下後頭眩身撻者茯苓桂枝甘草湯心下痞滿者暫與
枳梗湯加茯苓汗下後表裏俱虛及素虛之人微發其汗

膚瞤肉戰喘促汗出如油者死
動氣在左發汗有此症者亦危

風熱極而癰短瘰長

俗云摘也癰則筋脉急而縮短瘰則筋脉緩而弛長急緩之間筋脉牽引

伸縮不定狀如風癰可畏多因汗下脾土受傷木旺風熱熾盛故手足動搖摘搦必平木降火以柴胡山梔滌熱防風羌活祛風兼佐和血化痰之藥治之與瘰大同如聖餅子引風湯陶氏如聖飲選用結胃失下有此症者大承氣湯風溫被火癰瘰萎瘰湯火邪湯經曰大陽終者戴眼反折瘰瘰汗出不流者死

邪氣勝則心寒而慄也屬陰正氣勝則身振而戰也屬陽

戰者身振而動慄者心戰而惕邪氣外與正爭正氣勝則戰邪氣內與正爭邪氣勝則慄戰則病欲愈慄則病欲甚戰屬陽故一戰挫之間而真陽鼓動大汗以解不必藥也慄屬陰陰無勝陽之理故恐懼不戰而承乎陽於是陽反為陰所制心寒足蹇鼓頷厥冷便溺妄出不知人事純乎陰而陽敗遂成寒症宜理中四逆甚則養正丹併灸關元穴若復躁極而不得卧者不治若原係傳經熱症口渴咬牙進厥冷有時溫和脉大而數表症慄者羌活沖和湯裏

証候者大
柴胡湯

蚘厥却緣多饑虫攻咽及攻胃厥陰又手足厥逆義也其人素有食蚘或因病過饑虫逆上咽膈而出妄發其汗以致胃冷長虫上攻咽膈胃氣困乏雖饑不能食食即吐蚘者虫聞食臭氣而出也外症乍靜乍煩者虫或上或下也又或下利臟寒則蚘亦上入于膈然上焦熱而中下焦寒故雖煩熱消渴便硬不可遷投涼藥當先以烏梅丸理中湯安蚘然後隨症調之或煩熱不退者小柴胡湯或熱甚昏瞶腹脹便閉或蚘不得安從大便而出者大柴胡湯

狐惑蓋緣失汗虫食臟及食肛此亦虫症也如狐聽冰猶寒或因傷寒變成其候四肢沉重飲食惡聞食氣欲眠目不能開舌白齒晦面自色變無常虫食下部為狐下唇有瘡其咽乾虫食其喉為惑上唇有瘡其聲啞殺入其急皆因汗下失宜邪熱入腹以致飲食少而腸胃虛甚則三

重舉而食入五臟食上部者三黃瀉心湯主之食下部者
卑苦參煎湯淹洗之食肝門外者用生艾汁調雄黃末燒
烟薰之通用黃連犀角湯治蠱毒赤白湯金液丹雄黃
銑散又濕蠱虫症與狐惑症同但專食其臟為異耳

陰陽發斑總起火誰知溫毒時毒傷寒陽症發斑謂之陽
毒春溫發斑謂之溫毒

夏熱發斑謂之熱毒時行與暴溫發斑謂之時毒名雖不
同同歸於熱或因當汗不汗及已汗而熱氣不散表虛裏
實而發者或因當下不下熱蓄於胃而發者或因下早熱
邪乘虛入胃傷血不散而發者或因誤服溫藥胃熱焦爛
而發者然皆心火入肺故見紅點於皮毛之間輕如疹子
蚊迹只在手足先紅後黃重如錦紋發在胃腹先紅後黃
切忌發汗重令開泄甚則皮膚斑爛陽毒具而紅潤稀疎
起發五六日即愈若陰毒見而黑斑稠密成片身寒六七
日死先紅後黯如果實者亦死○陽毒舌焦鼻煤發斑者
陽毒升麻湯白虎加參湯熱甚者三黃石膏湯三黃瀉心
湯陶氏消斑青黛飲選用有斑瘡如豌豆者黃連一物湯
水煎濃汁服或青黛一物湯熱病發斑與陽毒同○溫毒

因冬煖感溫氣至春風氣相搏發為癰疹多痒初起升麻葛根湯加玄參或敗毒散加紫草赤芍日久發渴腹滿便硬者調胃承氣湯加黃連赤芍生地牡丹皮已經汗下而毒不解者黑膏主之○熱病發斑時行發斑身如火色者大青四物湯猪膽鷄子湯○發斑雜症咽痛玄參升麻湯或紫雪嚙之飢逆下利者黃連橘皮湯心煩嘔吐者葛根橘皮湯血熱內結者小柴胡湯犀角地黃湯斑盛破爛者芒硝猪膽汁法凡汗下不解足冷耳聾煩悶咳嘔便是發斑之候宜化斑消斑之藥以防之諸斑藥皆通用惟溫毒挾風稍殊耳○陰症亦有發斑者乃相火乘肺故但出於胃背手足稀少脉沉身無大熱為異宜理中湯或加附子玄參

血潮如狂有是症爭似發狂凶狂

有陰盛發躁欲坐井地如狂者有火邪驚悸不

安如狂者然血潮如狂有三症與陽毒如狂相似故舉言之一○如狂屬瘀血者脉沉實多漱水不嚙有無表症但血下焦小便自利如狂者有無長裏症脉數善饑不大便如狂者有太陽初症熱絳下焦如狂者血自下者即愈如

外未解者桂枝湯陶氏桂枝飲外已解但小腹急結者挑
仁承氣湯挾血傳心脾者當歸活血湯有太陰身黃溺注
如狂者五苓散此皆如狂但腹中忽欲起行錯言妄語猶
如諫阻尚可制藥非若發狂勢凶莫能禦也○發狂者熱
毒在胃併入於心遂使神昏不定言動急速妄譫妄笑甚
則登高而歌棄衣而走踰垣上屋不饑不卧皆因汗下失
宜陽氣亢極陰氣暴虛非大吐下不止傷寒四五日身熱
煩躁不得汗發狂者表裏俱熱三黃石膏湯雙解散傷寒
六七日壯熱胃滿便閉脉實數發狂者太承氣湯加黃連
陽毒暴盛發狂多乾嘔面赤發斑咽痛下利黃赤壯熱而
不得汗者葶藶苦酒湯咽痛吐膿血者陽毒升麻湯潮熱
甚者梔子仁湯潮熱太便秘閉者升麻葛根湯加大黃或三
黃湯發斑不可下者草龍膽一味水煎服在走者瓜蒂散
吐痰時行熱毒發狂者黑奴丸通用水漬法火劫法王氏
玄明粉凡發狂見陽症陽脉者順
見陰症陰脉及舌卷囊縮者即死

多眠陰盛而晝寢不厭

傷寒邪傳陰則多眠昏皆閉目者
陰主闔也默默不欲言者陰主靜

也有太陽病外已解而神將復者設若胃滿脇痛鼻乾得汗者小柴胡湯脉浮者活冲和湯冬月麻黃湯有陽明熱伏於裏而喘者小柴胡湯少陰脉沈細自利欲吐而渴多眠者四逆湯加入參茯苓以益陰回陽或熱病得汗後脉沈細身冷初覺安靜漸次昏沈喜卧不省亦急與四逆湯令四肢溫不爾有熱睡而死者合病目合則汗出風溫常不了了然或精神恍惚治見各條惟汗下後耐睡者為正氣已復不必藥也

不眠陽盛而夜卧不遑

或終夜煩擾或晝夜惺惺不眠未

根解肌湯在裏屬心神不清者大承氣湯已經汗下不眠津液乾熱盛陰虛胃不和也太陽發汗過多躁不得眠欲飲水者即愈若脉浮而渴小便難者五苓散汗吐下後懊憹不眠者枳實湯晝夜不眠者酸棗仁湯錯語乾嘔不眠者解毒湯譫語小便淋瀝煩躁少睡者白虎湯加山梔枳實血者犀角地黄湯少陰下利而渴或因下後不得眠者猪苓湯少陰二三日心煩不眠者黃連鷄子湯下後陽虛脉沈無表症夜靜晝煩不得眠者宜古姜附湯或四逆湯

加茯苓汗多者小建中湯傷寒瘧後不眠者陰氣未復也
施子烏梅湯或溫膽湯加竹茹虛者十味溫膽湯精神恍
惚者朱雀丸古法不眠者卑熱酸
裏散多眠者卑生酸裏散亦好

常病常法易知變病變法難詳

右一段論傷寒雜症從面至足及眠逐一詳審以

便問症云

陰症微甚分於便閉便通

三陰經血分自受寒謂之陰症有微甚不同微者寒邪自背俞

漸入少陰故表鬱亦能發熱但終不如陽症熱甚亦或頭
疼但肢厥脉沉為異古法麻黃附子細辛湯麻黃附子甘
草湯附子細辛湯近用辛黃三白湯微而腹痛手足清冷
便閉者桂枝加芍藥湯甘草乾姜湯理中丸有表復有裏
者人參三白湯或附子細辛湯加大黃甚者不自表分漸
入或上從鼻入或下從足入卒中陰經初起無頭疼身熱

便惡寒厥冷或胃腹滿痛嘔利間有熱者虛陽之氣外浮耳太陰腹痛自利附子理中湯痛甚理中合小建中湯瀝理中合五苓散少陰口和背惡寒身痛虛渴或發熱脉沈下利者名夾陰傷寒附子湯少陰下利清穀或咽痛脉微者四逆湯利不止脉欲絕者白通湯無脉者白通加猪膽汁湯厥陰下利小腹痛或消渴吐蛔者當歸四逆湯凡陰症唇青舌黑或白虛或卷驗者用生姜頻擦唇口擦於黑轉為紅乃吉

陰症常變寒其有力無力

厥冷吐利不渴靜謐此陰症之常也若發熱面赤煩躁飲冷脉

大散衣去被此陰症之變也若認作陽症投涼必死須察脉有力無力如重按無力或全無者便是伏陰急與五積散通解表裏之寒甚加姜附如果有有力乃陽症似陰也不可不辨陰症無脉者姜酒半盞服之或吞四順丸又病人有痛處當知痛甚者脉必伏如無痛症用此法脉不來者死如原無正脉須覆手取之乃陰陽錯亂也宜和合陰陽陰厥不熱便厥而下利凄清陰厥者未厥前無頭疼無身熱吐利不渴靜謐等症乃陰

邪獨勝而然手足盡冷乃厥陰所主陰陽之氣不相接逆而然非此傳經四逆之漸冷也太陰厥手足指頭微冷者理中湯少陰厥脛寒足冷甚則手至臂足至膝者四逆湯通脈四逆湯厥陰厥一身盡冷者當歸四逆湯厥逆煩躁者不_レ治_二百問云_一冷厥初得病四肢逆冷脉沈細臥多驚足或惡寒指甲青色或自引衣覆身或下利清穀或清便自調小便數外症惺惺此冷厥也四逆湯三味參更湯選用凡病熱多厥少者易愈厥多熱少者難已又有血厥四物湯氣厥四君子湯暑厥白虎湯水厥心下忪忪茯苓桂枝湯尺厥即中惡胃犯不正之氣而然木香勻氣散合平胃散或追魂湯

陽厥微厥便熱而下利黃赤

陽厥者未_レ厥前有頭疼有身熱潮汗閉澀滿渴狂譫症具

陽邪深入陷伏於內而後發厥微厥半日間即又發熱熱氣下行則腹痛下利後重結粘黃赤必見膿血若不_レ便血熱氣上行則必_レ喉痺又熱厥傳經七日不退者其後必便膿血若陰厥腹痛下利清白不渴以辨之尤的謫前熱厥

暈厥 扶痰與伏火

暈者昏暈傷寒乃熱結胃滿痰盛口禁不省人事先用綸帕裹指牙齦上頻頻

擦之候牙寬却用大承氣下之

臟厥 發躁無休

發熱七八日脉微膚冷而躁或吐或瀉無時暫安者此乃厥陰真臟氣盡故曰

臟厥仲景無治法四逆湯冷飲救之又少陰厥而吐利發躁者亦不治三味參黃湯救之

陰毒 冷汗甲青而六脉沈細身痛若鞭

三陰病深必變為陰毒有初症遲然

而成者有誤服寒藥或吐下後變而成者蓋以房勞損腎生冷傷脾內已伏陰外又感寒致之內外皆陰陽氣暴絕故其外症吐常陰症厥冷吐利不絕身重其則咽痛鄭聲加以頭痛頭汗赤睛內痛不欲見光而唇指甲青黑手背冷汗心下結硬臍腹築痛身如鞭朴外腎冰冷或便膿血診其脉附骨取之則有數之則無宜甘草湯正陽散或玄試湯加入參選用陽氣復而大汗解矣陽氣乍復或生煩躁者返陰丹復陽丹金液丹不可涼藥並加生薑良姜要

葉也。外泄火氣，但不可大近。叔和詩云：陰毒傷寒，身體重，背強，眼痛，不甚任，小腹痛，急口青黑，毒氣衝心，轉不禁，四肢厥冷，惟思吐下，利咽疼，脉細沉，若能速灸臍輪下六日，看過見喜，深葱熨，法見結胸，以手足和為吉，如手足指冷，甲下肉黑者死。

陽毒無汗，眼紅而遍身斑紋，胃緊若石。

三陽病深，必變為陽毒。有初病，遷延然。

而成者，有經吐下，妄而成者，多因酒麪金石，僭燥腸胃，極熱所致。又或症屬陽明，誤投溫藥，助熱為邪，內外皆陽，陰氣暴絕，故耳外症，此常陽症。潮汗閉，溢滿渴，狂譫，甚則發瘈，喘急，加以吐血咽腫，兩眼如火，六脉洪大，促數，宜黑奴丸。自煎湯，三黃湯，生地，芥連湯，陽毒升麻湯，咽痛及赤斑者，青黛一物，每用二錢，井水調服，或活龍散尤妙。陰氣復而大汗解矣。外用冷水蘸紙搭胃熱，又易之。詩云：陽毒發，亂四肢煩，面赤生花，生點斑，狂言妄語，如神鬼下利，黃赤喉不安，汗出遍身，應大瘡，魚口開，張命故，翻有藥不辜，但與服，能過七日，漸能安。又陰陽二毒伏逆，變為結胸，有自

利者有大便閉用藥而不得利者宜結胃條灸膈法以利
之陽毒內服活龍散陰毒內服破結丹瘰癧陰毒得泄則
陽氣復陽毒得泄則陰氣復陰陽升降榮衛流行自
然大汗而解矣若心下已結處至五日間斷不可活

陽盛拒陰大熱症也脉數而身反盡寒

陰盛拒陽大冷症也身熱而脉不鼓擊

此言陰陽隔絕必死之症不特極與

毒而已病人身寒厥冷其脉沉微按之鼓擊於指下者非
真寒也此名陽盛拒陰宜三黃巨勝湯身熱脉數按之不

擊或身冷而欲坐井中欲飲水而不入口
者非真熱也此名陰盛拒陽宜霹靂散

取症而不取脉可汗可下

脉浮可下以熱入府而不大便
微使大便不難其取下之乎脉

流可汗以熱在表故也故用溫藥
微汗借使身不發熱其取汗之乎

憑脉而不憑症似陽似陰

常法清高貴客脉症兩憑勞苦
粗人多憑外症又有信一二分

症者又有信一二分脉者須要臨時參酌傷寒陽症似陰陰症似陽全憑脉斷

太陽症裏虛而脉沉補中宜發而反沉者裏虛氣衰也急

宜救裏使正氣內強逼邪自出四逆湯中用姜附補中兼發散也假如裏不寒則脉必浮乃麻黃常症耳

少陰症表鬱而反熱發中宜補少陰症當脉沈無頭疼無

表鬱閉為熱耳然終無大熱或下利手足冷為異耳用麻

黃以發表間之熱熱附以溫少陰之經加細辛為汗劑之

重者去細辛加甘草為汗劑之輕者若使寒邪入裏則外

必無熱是四逆症也噫太陽少陰脉沈發熱同而受病與

藥別也微哉他如少陰心煩不得眠或咽澀聲不出或咳

而嘔渴或口燥咽乾腹脹不大便數症皆熱也豈可驟以

溫藥治之耶

脉伏而必有邪汗當攻尚非真氣之脫亡一手無脉謂之單伏兩手無脉

謂之雙伏雜病得之則危傷寒表症脉伏因寒邪鬱閉其
脉冬月麻黃湯三時羌活中和湯以汗之不可誤為陽得
陰脉如裏主脉伏因熱邪陷結而不流通宜
利小便陰病稍減而脉至乃敢審症輕重下之

脉無而將欲正汗勿攻譬如久旱之甘雨傷寒病六七日

忽昏昧不省脉靜或無此欲作正汗如久旱將雨之吉兆

喘促無脉者加味生脉散中暑脉無者白虎加參湯陰躁

無脉者回陽返本湯下利脉不至者白通加猪膽汁湯或

因汗下太過無脉者亦必有正汗急用四逆湯溫之脉結

者炙甘草湯熱厥煩渴無脉者解毒湯合小柴胡調之寒

厥鬱閉其脉兩手俱無亦是好汗相逼汗出自愈麻黃附

子細辛湯或麻黃附子甘草湯加人參五味子以回陽助

汗諸症服藥仍前無汗脉不至者皆死汗出脉續出則愈

或先溫而後一汗身輕厥陰下利腹滿身疼先溫重

或先解而後一攻太陰症如狂者表邪未解熱結方便愈膀胱精氣與人不相當語語煩

躁先以桂枝湯解其外後以承氣
氣攻其裏小使不利者五苓散

有表症而反不可汗者焉必其表之將入於裏表症悉具
而發渴脉浮表將入裏未可
汗也設汗者玄武湯救之

有裏症而反不可攻者焉必其裏之未全於府裏症悉具
本可下也

若惡寒脉不實裏猶帶表未可
下也誤下者理中湯九救之

利半表而溫半裏半表裏極難識有言身前後者有言身
上下者有言太陽陽明之間者小柴胡

解少陽之半表裏也身後為太陽身前為陽明少陽居中
或從前或從後寒熱莫定此以身之前後而言也五苓散

分利膀胱之半表裏也膀胱寒水近陽明燥金水多則寒
多則熱故亦從來寒熱也此以太陽陽明之間而言也

理中湯治吐瀉不定上下之半
表裏也以身之上中下而言

汗三陰而下三陽

此皆變法也三陰不當發汗常也然太

陰脉浮桂枝湯厥陰脉浮弦為欲愈桂

麻各半湯以助其勢耳少陰反發熱脉沉麻黃附子細辛

湯汗之微熱無厥逆諸裏症者麻黃附子甘草湯微汗之

是三陰未入於臟者皆可汗之太陽忌下常也有魯汗吐

下而小便數大便閉者太陽陽明宜大承氣少陽陽明小

承氣正陽陽明調胃承氣是三陽已入於臟者皆

可下之胃與大小腸為三陽臟乃藏物之臟也

顛倒六經非真見不敢

脉絡貫通故也百症云均上頭痛

身熱也內實不大便者宜下外實

小便清者宜汗盡皆不拘常

法如此非真見能如是乎

反覆汗下有神乎何妨

以表裏邪未淨也

右一段論傳陽變陰之極變病變法推究融會以

盡其妙

戰汗已占病可解

戰者邪正相爭也。有戰而汗解者，太陽也。脉必浮緊，而乳浮為在表，乳為正氣。

虛故與邪戰而後解也。有不戰而汗解者，陽明也。脉必浮數，不乳浮為表，不乳為正氣，不虛故不戰而汗解也。有不戰不汗而解者，少陽也。雖有寒熱表邪，寸關尺大小浮沉遲數同等，而無偏勝，不日陰陽和平而自解矣。又柴胡症誤以藥下，而柴胡症仍在，不為逆，更與小柴胡服之，必蒸蒸汗出而解。日中得病者，夜半解；夜半得病者，日中解。凡身寒戰顫，戰慄急與姜米湯熱飲，以助其陽。老人虛弱發戰而汗不行，隨即昏悶者，不治。又渴甚飲過者，黑怒症也。亦汗出而解。

發痒誰識疾將移

發痒乃陽氣初回之象，非風非血燥也。

瘥後昏沈非怪魅

瘥後半月十日昏沈，少神錯語妄言，或無寒熱，或寒熱似瘧，或朝夕潮煩，皆由

汗出未徹，毒流心胞絡間。知母麻黃湯主之。無表邪者，陶氏蘊赤各半湯極妙。大病後喜唾痰者，理中湯胃熱虛煩。

而嘔者竹葉石羔湯加薑汁從腰以下有水腫者牡蠣澤
瀉湯手足攣摘者牛蒡根湯遺精者桂枝龍骨牡蠣湯加
鹿茸一錢或十味溫膽湯瘡後不食參苓白朮散枳朮丸
瘡後狂言益元散加辰砂瘡後失神及乾嘔柴胡百合湯
瘡後血迷當歸活血湯瘡後腰痛獨活寄生湯瘡後聾沈
補中益氣湯瘡後體瘦肌熱或咳嗽者用柴胡二錢甘草
五分水煎服瘡後陰虛盜汗補陰丸瘡後癰疾
等症俱照常治法輕者損穀節慾慎動自愈

遺毒

不散發瘡

瘡

凡傷寒三日後脉數而熱不罷者此為

發瘡癰或汗出不徹項後

耳後連頰腮有結核硬腫者謂之發頤或下之盡熱氣
流於大腸或肝門并小腹腫痛謂之臍毒或瘡後項下頸
邊生風堆數枚不紅不痛如瘰癧之狀或瘡後
發疹者俱宜清熱涼血消毒去風外科法治之

瘡後食復

飲酒復者熱甚

復者其病如初也傷寒新瘡津

液未復血氣尚虛或梳洗太早

言動思為太過則成勞復蓋勞則生熱熱氣乘虛還入經絡
未免再復治宜清熱解勞小柴胡湯麥門冬湯和之熱

氣浮者，施鼓枳實湯。鼻屎鼓湯，表症多者，柴胡桂枝湯。汗之裏症多者，大柴胡湯。下之。○傷寒新瘧，胃氣尚弱，若恣飲，食不能化，濁穢臟腑，依前發熱。若用調和脾胃藥，胃熱轉增。大凡傷寒無和胃之理。治須清熱消食，輕者胃中微滿，謂之遺熱，損穀自愈。重者胃高喘滿，胃脹必須吐下。施鼓枳黃湯。主之。煩熱甚者，竹葉石膏湯。胃痞者，生薑瀉心湯。○飲酒復者，其熱尤甚。蓋酒性至熱，必煩躁乾嘔，舌上胎妄語不寐者，解毒湯。或草龍膽一味水煎服。汗出自解。凡復症，先病七日出汗而解。今復舉亦必七日而解。先病十四日出汗而解。今復舉亦必十四日而解。雖三、四次復舉，亦必三、四次戰汗而解。但勞復症久不愈，恐成癆瘵。

陰陽易陰陽交者命危
男子新瘧，婦人與之交而反得病。曰陽易。婦人新瘧，男子與之交而反得病。曰陰易。言陰陽感動，其毒著人，如換易也。其

病狀身熱，熱極，頭重不能舉，眼內生花，乃所易之毒上衝也。四肢拘急，小腹腰膝皆痛，陰腫，手足攣卷，陰氣已絕，邪雜入，腹痛引陰中，吐舌數寸，而脉離經者，即死。縱不死，

百節解散經脈緩弱氣血骨髓空竭恍惚呼吸氣力轉少不能著床起居仰人牽引歲月伸屈有痺痺散赤衣散復鼠糞湯可救其失囊縮腹引陰痛欲絕者單青竹皮水煎服之陰火上衝面赤如烘熱心曾煩悶者八物湯竹皮逍遙散四肢拘急不任者當歸白朮湯或單乾姜四兩水煎溫服汗出手足自伸挾痰惡寒嘔逆者橘皮竹茹湯○有不因易而自病復者名曰女勞復症治亦相同但多增寒發熱用假鼠屎炙竹皮燒棍之類虛弱者兼用人參逍遙散小腹急痛厥冷者當歸四逆湯加吳萸附子論云餘勞尚可女勞即死○陰陽交者凡發汗後脈躁疾不爲汗衰狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣爲邪所傷不可分別此死症也

一病

百合經絡將何以識

病後未甚平復失於調理餘症

陰醫反汗之以攻陽以此百脉一宗各不得其無復經絡傳次似寒又無寒似熱又無熱欲食不能食欲卧不能卧欲行不能行有時又或強健但能睡卧不能行口作苦藥入即吐有如此邪祟治以百合爲主以其能和百脉也分

汗吐下後加減及陶氏柴胡百合湯渴者瓜蒌牡蠣湯又
百合洗法洗後啖食將養勿用鹽豉頭痛者六十日愈不
痛者四十日愈頭
眩者二十日愈

遍身不仁針火頑然無知不仁者頑麻不知痛痒汗下氣

襲經絡凝滯經日少陰脉不至腎氣微精血少寒氣上奔
血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁是為

尸厥甘草乾姜湯桂枝湯加芍藥乾姜補中益氣湯駱
龍升麻湯桂麻各半湯選用此不仁與前鬱冒不仁同

四般壞症犯何逆傷寒病邪未退或重感寒變為溫瘧或
重感風變為風溫或再感濕熱變為溫

毒或重感疫氣變為溫疫又太陽病三日已汗吐下及溫

針不解者此為壞病言正氣已虛而邪氣留滯及過經不

解瘧後虛羸少氣皆各壞症疾候變易不常必視其犯何

逆以治之表症多者知母麻黃湯半表者小柴胡湯溫膽

湯餘熱不解者參胡芍藥湯大渴者黑奴丸

虛煩者竹葉石膏湯諸藥不効者驚風散

五臟死候巧莫施

水漿不入汗如油形體不仁喘不休命絕也汗出髮潤肺先絕也形如烟薰直

視搖頭心絕也唇吻反青肝絕也環口鰲黑柔汗發黃脾

絕也沒便遺失狂言直視腎絕也陽氣前絕陰氣後竭其

人死身色必青陰氣前絕陽

氣後竭人死身色必赤

揅衣摸床

常白壁臥頭不安枕脈溢揅衣

縫者死脈弦者生謂敗症皆然此症發執謔語大承氣湯

下之如發黃渴利者津液交竭猶可救療若溺澀者難治

推頭直視風瘥非絕於心

陽脈不和則頭為之搖有心絕

瘥病風盛則瘥者小續命湯加麻有裏痛而瘥者言者為

虛不言者為實如瘥者言者為虛言者為實○

臟腑精華皆注於目直視者反自倒竄眼睛上騰死症也

惟無表裏症目中不了了睛不和者乃內熱神昏非直視

也又衄血發汗則直視血虛發汗亦直視脈

弦者可救若脈澁狂言謔語喘滿直視必死

口張目陷不復肢冷臍硬難禁

腎氣下脫遺尿

小便自遺惡症也陽邪神昏自遺而猶知者清熱可愈合病遺尿白虎湯裏熱承氣

湯瘀血承氣湯陰邪氣脫自遺若不知者溫補救其萬一餘熱氣虛有火者補中益氣湯加知母黃柏五味子麥門冬下虛者四逆湯加益智仁藁縮者三味參更湯加附子大劑急救之狂言直視冷汗遺尿者腎絕即死風溫直視遺尿亦死

心竅有毒失音

肺主聲被火傷而唐虛有少陰病咽啞生瘡而不能言者鷄黃苦酒湯厥陰囊縮不

能言者小承氣湯有微感症聲啞不能言者有症病不能言者有風溫下利不語者有中暑失音有瘀血迷心失音者各宜分治須謂道二便以通心竅為先通由通關散吹鼻

皆圓行方竊唐進士之正學好生起死慕秦越人之慈心

唐時醫道大衰孫思邈因醫而張為技流朱子惜之故小學引其言曰智欲圓而行欲方膽欲大而心欲小此真醫學之秘訣也世有等記誦古今醫籍而治人無効者非失之方而不圓通遺失之心粗而膽小耳果欲遂吾好生之心以濟世應疾如扁鵲有起死之功當先理孫真人之學問云

婦人傷寒與男無異經來經斷名曰熱入血室

仲景傷寒不分男女

但婦人以血為主血室即冲脉血海也如傷寒發熱經水適來晝則明夜則暗語如見鬼狀經行盡則熱隨血散不治自愈如經盡熱退身涼曾謂如結胃或證語者乃邪氣結於胃腸按之痛者亦謂之血結胃宜海蛤散桂枝紅花湯婦人傷寒寒熱必經水適斷者亦名熱入血室其血必結而不行小柴胡湯或黃芩湯加牡丹皮芍藥人此症最多切忌下若見喜忘如狂腹滿泉清當以血法治之不可拘於不下也然男女均有此血海在男子而室得熱則必妄行多為下血證諸頭汗見陽明症為異耳男子由陽明而傷婦人隨經而入

產前產後謂之法無犯胃

產前安胎產後補血為主古法無犯胃氣及上二焦犯胃氣者

謂攻下也犯上焦者謂發汗也犯中焦者謂取吐也不可發汗吐下但當和解胎前凡藥必加白朮黃芩安胎為主尋常外感小柴胡去半夏加白朮合四物湯或合四君子湯最能保胎除熱如傷寒太陽症見九味羌活湯合四物湯陽明症見升麻葛根湯少陽症見小柴胡湯太陰症見平胃散加白朮枳實熱者太柴胡湯加厚朴當歸少陰症見人參三白湯加當歸熱者涼膈散厥陰症見理中湯熱者六一順氣湯已上俱宜合四物湯服之其餘變症照依古法表症具者芍藥散古本木湯前胡七物湯黃龍湯傷暑者柴胡石膏湯嘔逆不食胎動者麥門冬湯嘔吐不食心煩者蘆根湯發熱煩悶者生薑根一味水煎服發熱者梔子大青湯升麻六物湯發狂者秦艽散時氣大熱忌胎墜者用伏龍肝末水調塗臍下乾則再塗病瘥乃止如胎已死者葱豉湯葱白一物湯○產後傷寒發熱宜四物湯倍芍藥加軟柴胡炒乾姜人參佐之如惡露未去者柴胡破瘀湯凡藥必加四物湯為主乃養血之源也六經見症

同胎前用藥外感四氣咳嗽惡阻旋覆花

湯面赤發喘竹葉防風湯更參婦人門

浮沉升降順天時

天地陰陽之氣鼓擊而生春夏秋冬一至一陽上外夏至一陰下降二至則氣

同二分則氣異陰陽相錯而人病由生此事難知云春不

服白虎為浮金也秋不服柴胡為瀉木也以此推之春耳

夏辛秋酸冬苦四季宜鹹

南北東西隨水土

東南山谷地氣濕熱病多自汗西北高燥地氣寒涼病多無汗中原上鬱病多

膨脹飲食居處各各不同故麻黃桂枝自西北二方居人四時服之無不應驗自江淮間惟冬及春可行之

潛心之下真有易道存焉

六經各義有八卦之理此事難知以六十四卦配合日用至於

朝大黃暮附子朝附子暮大黃變易之義也麻黃

桂枝瓜蒂等方卦象辭例也泥象執方不知易也

反掌之間似乎兵法萬矣

東垣曰用藥如用兵機無輕發此事難知云治法如孫子用兵

若在山谷則塞淵泉在水陸則把渡口在平川廣野當青
野千里塞淵泉者刺俞穴把渡口者奪病發時前青野千
里者如肌瘦羸宜廣服大藥以養正又曰補益
者守也汗吐下者攻也調和者廣畧而決勝也

由丹溪而入長沙秋江澄徹

涉河澗而步東垣春山紅紫
仲景傷寒專為霜降至春分
即病者設河澗補溫暑一法

丹溪分別時令直中東垣力辨內傷外感
經肯透徹真如春山千紅萬紫無所不備
人耳議者謂陰症難病乃後人增入論中又
謂溫暑亦無陰症皆道其常而不知其變耳

噫學未究乎張劉朱李且勿議乎叔和無已勉之勉之醫
囊無底

右一段論瘧症危症死症及婦人傷寒



